



## Alcachofa, Boldo, Daucus Carota y Mentol

Gotas

Lea con cuidado esta información antes de tomar Hepatalgina®.

**¿Qué contiene Hepatalgina®?** Cada 100 ml contiene: Alcoholato de Alcachofa 46,23 ml, Tintura de Boldo 10,13 ml, Alcoholato de Daucus Carota 43,64 ml, Mentol 0,152 g.

**¿Qué efecto tiene Hepatalgina®?** Hepatalgina® es una combinación de sustancias: su principal componente activo es de origen natural (vegetal), extraído de las hojas de Cynara scolymus (alcachofa o alcaucil) tradicionalmente utilizado como protector del hígado, es digestivo, aumenta la cantidad de bilis (colerético) y facilita su pasaje al tubo digestivo (colagogo) y se ha complementado su fórmula con extractos que ayudan al proceso digestivo.

Es un producto que estimula la función del hígado y de la vesícula biliar.

**¿Para qué se usa Hepatalgina®?** Para los trastornos del hígado y de la vesícula biliar con manifestaciones de pesadez estomacal.

**¿Cómo se usa Hepatalgina®?**

Adultos: tomar 30 a 40 gotas tres veces por día antes o después de las comidas, con un poco de agua.

Niños: mayores de 6 años: 10 a 15 gotas en la misma forma.

**¿Qué personas no pueden recibir este medicamento?**

- Niños menores de 6 años.
- No utilizar en caso de obstrucción completa de las vías biliares principales o enfermedad grave del hígado.

**¿Qué reacción adversa puede provocarme la toma de este medicamento?** En algunos pacientes puede provocar deposiciones blandas o frecuentes.

**¿Qué cuidados debo tener antes de usar este medicamento?** Consulte a su médico en los siguientes casos:

- si Ud. está tomando otro medicamento, está embarazada o dando de mamar.
- si conoce o sospecha que padece de trastornos en hígado y/o riñón.
- si recuerda haber tenido una reacción alérgica a alguno de los componentes del medicamento.

**¿Qué cuidados debo tener mientras tomo Hepatalgina®?**

- En caso de tomar este medicamento para aliviar molestias digestivas y si las mismas persisten o empeoran, consulte al médico inmediatamente, especialmente si se trata de dolor. No espere más de 5 días sin consultar al médico.

**Interacciones con otros medicamentos**

- No debe administrarse en pacientes bajo tratamiento con disulfiram (el disulfiram se usa para tratar el alcoholismo crónico).

**DEBIDO AL CONTENIDO DE ALCOHOL ETÍLICO/ETANOL COMO EXCIPIENTE, SE DEBERÁN TENER PRECAUCIONES EN PERSONAS CON ENFERMEDAD DEL HÍGADO, ALCOHOLISMO, EPILEPSIA, EMBARAZADAS, NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

**SOBREDOSIS:** ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital Dr. A. Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160.

Para otras consultas: Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix **0800-333-3532**.

**PRESENTACIONES:** frascos conteniendo 45 y 120 ml.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**CONSERVACIÓN:** conservar a temperatura ambiente por debajo de 25°C.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 2.924. Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico. Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica: **0800-333-3532** [www.elea.com](http://www.elea.com)

Fecha de última revisión: Mayo/2014

*"El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial impreso en sistema Braille para facilitar su identificación por los pacientes no videntes".*

507040-00 1-vu-br

**ELEA**