



Venta Libre • INDUSTRIA ARGENTINA

Cetirizina Clorhidrato 1 mg/ml

Solución oral

¿Qué contiene Alernix® 24 Pediátrico?

Cada 1 ml de Alernix® 24 Pediátrico Solución oral contiene:

Ingrediente activo: Cetirizina Clorhidrato 1 mg.

Excipientes: sacarosa; propilenglicol; glicerina; metilparabeno; propilparabeno; ácido acético glacial; acetato de sodio trihidrato; esencia de cereza; hidróxido de sodio c.s.p. pH 4.5; agua purificada. **Este Medicamento es Libre de Gluten.**

**LEA CON CUIDADO
ESTA INFORMACIÓN ANTES
DE TOMAR EL MEDICAMENTO.**

Conserve este prospecto, contiene información que puede serle útil volver a leer.

Acción: Antialérgico. Antihistamínico.

¿Qué es Alernix® 24 Pediátrico?

Alernix® 24 Pediátrico es una solución oral que contiene Cetirizina Clorhidrato que tiene acción antialérgica.

¿Para qué se utiliza Alernix® 24 Pediátrico?

Alernix® 24 Pediátrico se utiliza para el tratamiento sintomático de procesos alérgicos como la rinitis alérgica estacional y perenne y otras alergias del sistema respiratorio superior aliviando sus manifestaciones: goteo o secreción nasal, picazón de ojos, nariz y/o garganta, lagrimeo, estornudos. Alergias cutáneas.

¿Qué personas no pueden utilizar Alernix® 24 Pediátrico?

NO USE este medicamento si usted:

- es alérgico a alguno de los ingredientes activos o inactivos de la solución oral.
- es menor de 2 años, salvo indicación y prescripción del médico pediatra.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar Alernix® 24 Pediátrico?

Consulte a su médico si usted tiene:

- enfermedad de los riñones (insuficiencia renal) moderada o severa; su médico podría necesitar reducirle la dosis.
- enfermedad del hígado (insuficiencia hepática); su médico podría necesitar reducirle la dosis.
- embarazo o está dándole el pecho a su bebé.
- dificultad para digerir ciertos azúcares como la lactosa (insuficiencia de lactasa, galactosemia o síndrome de malabsorción de glucosa/galactosa).
- alergia a otros antialérgicos (antihistamínicos).

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte con su médico antes de utilizar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando Alernix® 24 Pediátrico?

Al igual que todos los medicamentos, Alernix® 24 Pediátrico puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas los sufran.

Como ocurre con otros antihistamínicos, se han reportado casos de sensación de sueño (somnia) con el uso de Cetirizina. Si presentara somnolencia se aconseja no manejar u operar con maquinaria que requiera estado de concentración y alerta. Si la somnolencia ocurre, también puede intentarse la toma de Alernix® 24 Pediátrico por la noche, si se requiere alerta durante el día.

Al igual que todos los antihistamínicos, debiera evitarse la administración de Cetirizina y el consumo excesivo de alcohol, sedantes y/o fármacos depresores del sistema nervioso central.

Suspender el tratamiento 48 horas antes de efectuar cualquier tipo de prueba de alergia cutánea, ya que los antialérgicos pueden impedir o disminuir las reacciones que de otra manera serían positivas.

Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece:

- dolor de cabeza
- dolor de garganta
- cansancio, sueño, nerviosismo
- dolor en la panza (dolor abdominal).
- ganas de vomitar (náuseas)
- mareos o inestabilidad
- boca seca

Si usted presenta cualquier efecto adverso no mencionado en el prospecto, suspenda el uso del medicamento inmediatamente y consulte a su médico.

Si los síntomas alérgicos persisten, empeoran o aparecen síntomas diferentes de los iniciales, consulte a su médico.

¿Cómo se utiliza Alernix® 24 Pediátrico?

Alernix® 24 Pediátrico es de administración por vía oral y puede ser ingerido con o sin agua. Una sola toma diaria produce alivio de los síntomas alérgicos las 24 horas. El momento de la administración puede variar según las necesidades del paciente.

Como posología habitual se aconseja:

EDAD	DOSIS
Niños entre 6 meses y 2 años	consulte con el médico pediatra
Niños entre 2 y 6 años	2,5 ml por día
Niños de 6 a 11 años	5 ml por día
Adultos y niños mayores de 12 años	10 ml por día
Adultos mayores de 65 años	5 ml por día

Si usted se olvidó de tomar Alernix® 24 Pediátrico, puede tomarlo tan pronto como sea posible, pero recuerde esperar 24 horas (1 día) antes de la próxima toma.

La duración del tratamiento no debe superar los cinco días consecutivos.

Si los síntomas alérgicos persisten o empeoran o se acompañan de otros/s síntoma/s nuevos, suspenda inmediatamente y consulte a su médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?

Si usted ha utilizado más Alernix® 24 Pediátrico de lo indicado en este prospecto, consulte a su médico.

Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/ (011) 4658-7777.
- Hospital de Niños Pedro Elizalde: Tel.: (011) 4300-2115.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160.

Presentación: envase conteniendo 120 ml de Solución oral.

¿Cómo guardar este medicamento?

Modo de conservación: conservar entre 15°C y 30°C, en su envase original.

Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 51.120.

Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica.

Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 0800-333-3532 | elea.com

¿Dudas o consultas?
0800-333-3532 (ELEA)

ANMAT responde: 0800-333-1234

