

# Adermicina® A

*Vitamina A, Ácido Bórico, Óxido de Zinc, Benzocaína, Cloruro de Benzalconio*

Crema - Vía tópica externa

VENTA LIBRE - INDUSTRIA ARGENTINA

## **LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO.**

Conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.

**Este medicamento es Libre de Gluten.**

### **¿Qué contiene Adermicina® A?**

Cada 100 gramos contiene: Vitamina A 100.000 UI, Ácido Bórico 2 g, Óxido de Zinc 15 g, Benzocaína 500 mg, Cloruro de Benzalconio 10 mg. Excipientes: talco, lanolina anhidra, vaselina sólida, vaselina líquida, vainillina, alcohol.

**ACCIÓN: Adermicina® A** es una crema germicida, cicatrizante, regeneradora y revitalizadora de los tejidos.

### **¿Para qué se usa Adermicina® A?**

**Adermicina® A** es una crema que se utiliza para regenerar la piel, aliviarla y protegerla de infecciones favoreciendo el proceso de cicatrización. Se puede utilizar en dermatitis, especialmente en dermatitis del pañal, en escaldaduras, paspaduras, quemaduras leves y heridas no infectadas.

### **¿Qué personas no pueden usar Adermicina® A?**

NO USE este medicamento si es alérgico a alguno de sus componentes.

### **¿Qué cuidados debo tener antes de usar Adermicina® A?**

No usar si la tapa o el pomo no se encuentran intactos.

En caso de estar tomando algún medicamento, en caso de embarazo o lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de usar **Adermicina® A**.

### **¿Cómo se usa Adermicina® A?**

**Adermicina® A** es solo para uso externo. No aplicar sobre áreas extensas de la piel. Evite el contacto con los ojos.

#### Modo de uso:

En la dermatitis del pañal, aplicar **Adermicina® A** luego de cada cambio.

En escaldaduras, paspaduras y quemaduras leves, aplicar **Adermicina® A** 2 a 3 veces al día.

En heridas no infectadas, higienizar la zona a tratar, aplicar **Adermicina® A** y cubrir con gasa estéril, repetir 2 a 3 veces al día.

Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días de tratamiento, consulte a su médico.

## ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando Adermicina® A?

Como todos los medicamentos, **Adermicina® A** puede tener efectos no deseados. Pueden aparecer reacciones locales de tipo alergia. La vitamina A puede absorberse a través de la piel, pudiendo provocar toxicidad, especialmente en los niños.

Si usted observa éstos o cualquier otro efecto no descrito en este prospecto, consulte a su médico.

## ¿Qué debo hacer ante una ingesta accidental o si tomé más cantidad de la necesaria (sobredosificación)?

Ante la eventualidad de una ingesta accidental o una posible sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital Dr. A. Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160.

Para otras consultas: Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix: **0800-333-3532**.

## CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C.

Conservar en su envase original. No debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

## PRESENTACIÓN

Pomo con 30 gramos y 60 gramos.

## ¿Dudas? ¿Consultas?

**0800-333-3532 (ELEA)**

**ANMAT responde: 0800-333-1234**

## MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 25.949.

Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico.

Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica: **0800-333-3532 | [elea.com](http://elea.com)**

Fecha de última revisión: Noviembre/2020

