

AGAROL® SUAVE

Indicaciones: Tratamiento sintomático de la constipación.

Dosis y administración: Adultos y niños mayores de 12 años: 1/2 a 2 cucharadas soperas (7,5 a 30 ml) al acostarse. Niños menores de 12 años: consultar a su médico. Agarol® Suave puede mezclarse con cualquier tipo de alimento o bebida.

AGITAR BIEN ANTES DE USAR. Conservar entre 15 y 30°C.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

501689-00 1-cs-g

Industria Argentina

Bajo Lic. W.L.
 PARKE-DAVIS

ELEA

Fórmula Frutilla: cada 100 ml de emulsión contiene: picosulfato de sodio 33,34 mg; vaselina líquida 28,22 g; agar-agar 0,30 g. Exc.: glicerina; goma arábiga; goma tragacanto; ácido cítrico anhidro; sacarina sódica; benzoato de sodio; albúmina de huevo en polvo; hipoclorito de calcio (70%); ácido benzoico; sabor frutilla; color FDyC Rojo N° 40; agua purificada c.s. **Fórmula Vainilla:** cada 100 ml de emulsión contiene: picosulfato de sodio 33,34 mg; vaselina líquida 28,22 g; agar-agar 0,30 g. Exc.: glicerina; goma arábiga; goma tragacanto; ácido cítrico anhidro; sacarina sódica; benzoato de sodio; albúmina de huevo en polvo; hipoclorito de calcio (70%); ácido benzoico; sabor vainilla; agua purificada c.s. **Fórmula Durazno:** cada 100 ml de emulsión contiene: picosulfato de sodio 33,34 mg; vaselina líquida 28,22 g; agar-agar 0,30 g. Exc.: glicerina; goma arábiga; goma tragacanto; ácido cítrico anhidro; sacarina sódica; benzoato de sodio; albúmina de huevo en polvo; hipoclorito de calcio (70%); ácido benzoico; sabor durazno; color FDyC amarillo N°6; agua purificada c.s. **Fórmula Ciruela:** cada 100 ml de emulsión contiene: picosulfato de sodio 33,34 mg;

vaselina líquida 28,22 g; agar-agar 0,30 g. Exc.: glicerina; goma arábiga; goma tragacanto; ácido cítrico anhidro; sacarina sódica; benzoato de sodio; albúmina de huevo en polvo; hipoclorito de calcio (70%); ácido benzoico; sabor ciruela; color FDyC rojo N°2; agua purificada c.s. **Uso del Medicamento. Lea detenidamente esta información:** Laxante estimulante. Modifica el intercambio hidroelectrolítico intestinal y estimula la motricidad colónica. El picosulfato de sodio es un laxante estimulante. Modifica el intercambio hidroelectrolítico y estimula el peristaltismo del intestino grueso. Su acción laxante se produce en un plazo de 8 a 12 hs. luego de su administración. La vaselina líquida o aceite mineral es el más conocido y utilizado de los lubricantes o ablandadores fecales. La vaselina líquida es prácticamente insoluble en agua e ingerida en emulsión no se absorbe sino que ablanda las heces evitando su endurecimiento excesivo y lubrica la mucosidad intestinal; de esta manera suaviza y facilita el pasaje de las heces. El Agar-Agar es un producto extraído de las algas marinas. Por sus propiedades higroscópicas, absorbe varias veces su peso en líquido,

lo cual ayuda a la formación de las heces.

Precauciones y advertencias: el tratamiento medicamentoso de la constipación no es más que un adyuvante del tratamiento higiénico dietético. Agarol® Suave no debe administrarse en forma prolongada ni a dosis mayores que las recomendadas en pacientes bajo tratamiento diurético, digitálico o esteroideo. La utilización prolongada de laxantes se desaconseja, no exceder de 8 a 10 días de tratamiento. El uso excesivo de laxantes puede provocar situación de "dependencia" que requiere de ingesta regular de laxantes, aumentando la posología necesaria en caso de constipación severa, o la "enfermedad de los laxantes" con colopatía funcional severa, melanosis recto colónica y alteraciones hidroelectrolíticas con hipocalcemia.

Embarazo y lactancia: No se aconseja su uso durante este período.

Quando tenga dolores de vientre, de estómago, náuseas o vómitos, no tome laxantes sin consultar antes a su médico. **Contraindicaciones:** colopatías orgánicas complementarias (enfermedad de Crohn, rectocolitis ulcerosa), síndrome oclusivo o subocclusivo, síndromes dolorosos o abdominales sin

diagnóstico. Pacientes con cuadros abdominales agudos (por ej. obstrucción intestinal). **Efectos adversos:** puede observarse malestar abdominal tipo cólico. El uso prolongado o una sobredosis puede provocar diarrea con pérdida excesiva de agua y electrolitos, particularmente potasio; desarrollo de un colon atónico no funcionante. Puede provocar dolores abdominales o diarrea, especialmente en personas con colon irritable. Su administración prolongada y en dosis elevadas puede producir pérdidas de potasio e hipocalcemia. **Interacciones:** antiarrítmicos (tipo quinina), sotalol, amiodarona, vincamina, digitálicos. Drogas hipocalcémicas (anfotericina B, corticoides y diuréticos hipokalemiantes, solos y asociados). **Sobredosis:** en caso de sobredosis accidental se recomienda consultar con un Ctro. Toxicológico: Hosp. de Niños R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 - Hosp. Posadas: (011) 4658-7777 - Ctro. Nac. de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Esp. Med. aut. por el M.S. Cert. N° 003 - Elab. por Lab. Elea S.A.C.I.F. y A., bajo licencia. excl. de Warner Lambert Co., U.S.A. - Sanabria 2353, CABA. Dir. Téc.: Isaac J. Nisenbaum, Farmacéutico. Última revisión: 10 / 2000

AGAROL® SUAVE

Indicaciones: Tratamiento sintomático de la constipación.

Dosis y administración: Adultos y niños mayores de 12 años: 1/2 a 2 cucharadas soperas (7,5 a 30 ml) al acostarse. Niños menores de 12 años: consultar a su médico. Agarol® Suave puede mezclarse con cualquier tipo de alimento o bebida. **AGITAR BIEN ANTES DE USAR.** Conservar entre 15 y 30° C.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.
501690-00 1-cs-g

Industria Argentina



ELEA

Fórmula Frutilla: cada 100 ml de emulsión contiene: picosulfato de sodio 33,34 mg; vaselina líquida 28,22 g; agar-agar 0,30 g. Exc.: glicerina; goma arábiga; goma tragacanto; ácido cítrico anhidro; sacarina sódica; benzoato de sodio; albúmina de huevo en polvo; hipoclorito de calcio (70%); ácido benzoico; sabor frutilla; color FDyC Rojo N° 40; agua purificada c.s.

Fórmula Vainilla: cada 100 ml de emulsión contiene: picosulfato de sodio 33,34 mg; vaselina líquida 28,22 g; agar-agar 0,30 g. Exc.: glicerina; goma arábiga; goma tragacanto; ácido cítrico anhidro; sacarina sódica; benzoato de sodio; albúmina de huevo en polvo; hipoclorito de calcio (70%); ácido benzoico; sabor vainilla; agua purificada c.s.

Fórmula Durazno: cada 100 ml de emulsión contiene: picosulfato de sodio 33,34 mg; vaselina líquida 28,22 g; agar-agar 0,30 g. Exc.: glicerina; goma arábiga; goma tragacanto; ácido cítrico anhidro; sacarina sódica; benzoato de sodio; albúmina de huevo en polvo; hipoclorito de calcio (70%); ácido benzoico; sabor durazno; color FDyC amarillo N°6; agua purificada c.s.

Fórmula Ciruela: cada 100 ml de emulsión contiene: picosulfato de sodio 33,34 mg; vaselina líquida 28,22 g; agar-agar 0,30 g. Exc.: glicerina; goma arábiga; goma tragacanto; ácido cítrico anhidro; sacarina sódica; benzoato de sodio; albúmina de huevo en polvo;

hipoclorito de calcio (70%); ácido benzoico; sabor ciruela; color FDyC rojo N°2; agua purificada c.s.

Uso del Medicamento. Lea detenidamente esta información: Laxante estimulante. Modifica el intercambio hidroelectrolítico intestinal y estimula la motricidad colónica. El picosulfato de sodio es un laxante estimulante. Modifica el intercambio hidroelectrolítico y estimula el peristaltismo del intestino grueso. Su acción laxante se produce en un plazo de 8 a 12 hs. luego de su administración. La vaselina líquida o aceite mineral es el más conocido y utilizado de los lubricantes o ablandadores fecales. La vaselina líquida es prácticamente insoluble en agua e ingerida en emulsión no se absorbe sino que ablanda las heces evitando su endurecimiento excesivo y lubrica la mucosidad intestinal; de esta manera suaviza y facilita el pasaje de las heces. El Agar-Agar es un producto extraído de las algas marinas. Por sus propiedades higroscópicas, absorbe varias veces su peso en líquido, lo cual ayuda a la formación de las heces.

Precauciones y advertencias: el tratamiento medicamentoso de la constipación no es más que un adyuvante del tratamiento higiénico dietético. Agarol® Suave no debe administrarse en forma prolongada ni a dosis mayores que las recomen-

dadas en pacientes bajo tratamiento diurético, digitalico o esteroideo. La utilización prolongada de laxantes se desaconseja, no exceder de 8 a 10 días de tratamiento. El uso excesivo de laxantes puede provocar situación de "dependencia" que requiere de ingesta regular de laxantes, aumentando la posología necesaria en caso de constipación severa, o la "enfermedad de los laxantes" con colopatía funcional severa, melanosis recto colónica y alteraciones hidroelectrolíticas con hipocalemia.

Embarazo y lactancia: No se aconseja su uso durante este período. Cuando tenga dolores de vientre, de estómago, náuseas o vómitos, no tome laxantes sin consultar antes a su médico.

Contraindicaciones: colopatías orgánicas complementarias (enfermedad de Crohn, rectocolitis ulcerosa), síndrome oclusivo o suboclusivo, síndromes dolorosos o abdominales sin diagnóstico. Pacientes con cuadros abdominales agudos (por ej. obstrucción intestinal).

Efectos adversos: puede observarse malestar abdominal tipo cólico. El uso prolongado o una sobredosis puede provocar diarrea con pérdida excesiva de agua y electrolitos, particularmente

potasio; desarrollo de un colon atónico no funcionante. Puede provocar dolores abdominales o diarrea, especialmente en personas con colon irritable. Su administración prolongada y en dosis elevadas puede producir pérdidas de potasio e hipocalemia.

Interacciones: antiarrítmicos (tipo quinina), sotalol, amiodarona, vincamina, digitalícos. Drogas hipocalcémicas (anfotericina B, corticoides y diuréticos hipokalemiantes, solos y asociados).

Sobredosis: en caso de sobredosis accidental se recomienda consultar con un Clín. Toxicológico:
- Hosp. de Niños R. Gutiérrez: (011) 4962-6666
- Hosp. Posadas: (011) 4658-7777
- Clín. Nac. de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Esp. Med. aut. por el M.S. Cert. N° 003
Elaborado por Lab. Elea S.A.C.I.F. y A., bajo licencia exclusiva de Warner Lambert Co., U.S.A.
Sanabria 2353, CABA.
Dir. Téc.: Isaac J. Nisenbaum, Farmacéutico.
Última revisión: 10 / 2000