

ALERNIX® SPRAY

XILOMETAZOLINA

CLORHIDRATO 0.1%

Spray intranasal solución

Venta Libre - INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE APLICARSE ALERNIX® SPRAY.

Conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene Alernix® Spray?

Cada 1 mililitro de spray intranasal solución contiene:

Principios activos: Xilometazolina Clorhidrato 1 mg.
Excipientes: cloruro de sodio, fosfato monosódico dihidratado, fosfato disódico anhidro, cloruro de benzalconio al 50%, EDTA disódico, hidroxipropilmetilcelulosa, sorbitol solución al 70%, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, agua purificada.

Este medicamento es Libre de Gluten.

Acción: descongestivo tópico de la mucosa nasal y rinofaríngea.

¿Para qué se utiliza Alernix® Spray?

Alernix® Spray se utiliza para descongestionar la nariz que se encuentra temporalmente congestionada o tapada por causa de resfríos, gripe, rinitis alérgica y sinusitis.

¿Cómo se utiliza Alernix® Spray?

Alernix® Spray es solo para uso tópico local en las fosas nasales. La dosis en adultos y en adolescentes mayores de 12 años es de 1 aplicación en cada orificio nasal 3 veces por día (según necesite).

No exceda la dosis de 3 aplicaciones diarias en cada fosa nasal especialmente en adolescentes. La última aplicación puede realizarse antes de irse a dormir (siempre y cuando no le provoque insomnio).

Para una mejor utilización de **Alernix® Spray** siga las instrucciones.

- Quite la tapa del aplicador.
- Antes de utilizarlo presione el spray intranasal varias veces

de manera que salga uniforme el medicamento.

3. Despeje la nariz de secreciones y mucosidad.

4. Introduzca el aplicador en un orificio nasal en posición vertical con el dedo pulgar debajo de la base y la boquilla entre dos dedos.

5. Presione una vez y tome aire por la nariz al mismo tiempo.

6. Haga el mismo procedimiento en el otro orificio nasal.

7. Limpie y seque la boquilla antes de colocar nuevamente la tapa después de su uso.

Para evitar contagios, es apropiado que un spray intranasal sea utilizado por una sola persona.

Si Ud. olvidó utilizar **Alernix® Spray**, no utilice una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué personas no pueden aplicarse Alernix® Spray?

NO USE este medicamento si usted:

- Es alérgico a alguno de los principios activos o inactivos.
- Es un niño menor de 12 años.
- Lo han operado recientemente de las fosas nasales o a través de la nariz.
- Tiene presión ocular alta (especialmente una condición llamada glaucoma de ángulo estrecho).
- Tiene rinitis crónica, pero con escasa o sin secreción (mucosidad).
- Es propenso a inflamaciones de los vasos sanguíneos que se encuentran en la nariz.
- Recibe un tratamiento con medicamentos antidepresivos llamados inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO).

No use este medicamento si está embarazada o cree estarlo.

¿Qué cuidados debo tener antes de aplicar Alernix® Spray?

Consulte a su médico si usted:

- Está en tratamiento con medicamentos antidepresivos, tranquilizantes, para bajar la presión arterial o para tratar el asma bronquial.
- Ha tenido dificultades para dormir o mareos utilizando medicamentos para tratar enfermedades del corazón y/o el asma.
- Ha padecido o padece las siguientes condiciones:
 - Enfermedades del corazón o del aparato circulatorio.
 - Presión arterial alta (hipertensión arterial).
 - Enfermedad de la glándula tiroides (llamada hipertiroidismo).
 - Niveles de azúcar en sangre elevados (diabetes mellitus).
 - Enfermedad de la próstata con dificultad al orinar (hipertrofia prostática).

En personas que son sensibles a los descongestivos, este medicamento puede causar dificultad para dormir, temblores en las extremidades y mareos. Consulte con su médico si presenta estos síntomas.

En general este medicamento no afecta la capacidad de manejar y de utilizar maquinarias. Si mientras usa este medicamento nota sueño o mareos no conduzca ni maneje máquinas peligrosas.

Si Ud. está dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de aplicarse Alernix® Spray.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy aplicando Alernix® Spray?

Alernix® Spray no debe ser utilizado durante más de 10 días consecutivos; si persisten los síntomas consulte con su médico.

El efecto de **Alernix® Spray** comienza dentro de los 2 minutos y dura hasta 12 horas. Es bien tolerado incluso en pacientes con una mucosa nasal sensible.

Al igual que todos los medicamentos, puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas lo sufran. Deje de utilizar este medicamento y consulte a su médico si presenta reacciones alérgicas (rash en la piel, picazón), visión borrosa, palpitaciones (sobre todo si los latidos que siente son rápidos e irregulares).

Puede aumentar la congestión nasal en lugar de disminuirla (efecto rebote).

Raramente puede ocasionar dificultad para conciliar el sueño. Si esto ocurre, evite utilizarlo a últimas horas de la tarde o durante la noche.

Las personas mayores de 65 años pueden tener mayor sensibilidad a este medicamento. Consulte con el médico sobre la conveniencia de utilización.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si se aplicó más cantidad de la necesaria?

Si usted se ha aplicado más **Alernix® Spray** de lo indicado en este prospecto, consulte a su médico.

Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247.

Hospital Dr. A. Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160.

¿Dudas? ¿Consultas?

0800-333-3532 (Elea Phoenix)

Anmat responde: 0800-333-1234

Presentación

Frasco con válvula spray por 10 ml con adaptador nasal.

¿Cómo guardar este medicamento?


Modo de conservación:

Conservar a temperatura ambiente hasta 25°C.


MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO


MODO DE USO




Agitación



Posición de los dedos para actuar la válvula



Aplicación



Reposición del protector

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 59.152.

Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica.
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica **0800-333-3532 | elea.com**

Fecha de la última revisión: Enero/2020



510502-00
30-jd-ep

Elea