



Anusol® F

crema

ANTIHEMORROIDAL

INDUSTRIA ARGENTINA
Venta Libre

**FENILEFRINA CLORHIDRATO
PRAMOXINA CLORHIDRATO
VASELINA SÓLIDA
GLICERINA**

Crema Rectal

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE
APLICARSE ANUSOL® F, conserve este prospecto, contiene información
que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene ANUSOL® F?

Cada 100 gramos de crema rectal contiene:

Principios activos: Fenilefrina clorhidrato 0.25 g, Pramoxina clorhidrato 1.00 g, Vaselina sólida 15.00 g, Glicerina 14.40 g.

Principios inactivos (excipientes): monoestearato de glicerilo, propileneglicol, sorbitan monoestearato, polisorbato 60, propilparabeno, metilparabeno, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, agua purificada.
Este medicamento es Libre de Gluten.

Acción: antihemorroidal.

¿Qué es ANUSOL® F?

ANUSOL® F es una crema de suave consistencia que contiene principios activos como la Pramoxina y la Fenilefrina con acción antihemorroidal.

¿Para qué se utiliza ANUSOL® F?

Esta crema se utiliza para el alivio de múltiples síntomas relacionados con las hemorroides.

- Disminuye el dolor y la quemazón localizada en el ano.
- Ayuda a aliviar la picazón y el malestar anal asociado con las hemorroides.
- Disminuye y retrae temporalmente el tejido hemoroidal y alivia la sensación de quemazón.
- Proporciona un revestimiento para aliviar las molestias anorrectales.
- Protege la superficie anorrectal inflamada e irritada y colabora a tener una defecación menos dolorosa.

¿Cómo se utiliza ANUSOL® F?

ANUSOL® F es solo para uso tópico local en la región anal. Es decir que solo debe ser aplicado directamente sobre la zona afectada.

- Limpie el área afectada sin摩擦 el lugar. Seque muy suave con un paño blando.
- Abra el tubo que contiene la crema quitando la tapa. La primera vez que lo abra, debe perforar el sello de aluminio del extremo superior del envase.
- Coloque el aplicador plástico en el envase de la crema e insértelo con suavidad en el ano. Puede lubricar este aplicador antes de colocarlo si lo desea.
- Apriete el envase de la crema para que salga del aplicador plástico. Colocar la crema, además, sobre el área externa del ano.
- Aplicar en la zona afectada hasta 4 veces por día. Especialmente por la noche, antes de acostarse, durante la mañana al levantarse o después de cada movimiento intestinal (después de defecar).
- Limpiar todo el aplicador después de cada uso y volver a colocar la tapa.

ANUSOL® F está indicado para adultos. Los menores de 12 años de edad, deben consultar a su médico.

¿Qué personas no pueden aplicarse ANUSOL® F? NO USE este medicamento si usted:

- Es alérgico a alguno de los principios activos.



- Es menor de 12 años.

¿Qué cuidados debo tener antes de aplicar ANUSOL® F?

Consulte a su médico si usted tiene:

- Enfermedades del corazón.
- Presión arterial alta (hipertensión arterial).
- Depresión.
- Problemas de la glándula tiroides.
- Diabetes.
- Dificultad para orinar por enfermedad en la próstata.
- Embarazo y durante el amamantamiento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy aplicando ANUSOL® F?

Al igual que todos los medicamentos, ANUSOL® F puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas lo sufren.

Ocasionalmente, algunas personas, pueden presentar ardor en el ano.

Suspenda el uso y consulte con su médico en el caso de que tenga sangrado por el ano, si los síntomas empeoran o no encuentra mejoría luego de una semana de tratamiento o si presenta mucho dolor durante la introducción del aplicador anal.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si se aplicó más cantidad de la necesaria?

Si usted se ha aplicado más ANUSOL® F de lo indicado en este prospecto, consulte a su médico.

Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:

- Hospital de "Pediatría Ricardo Gutiérrez" Tel.: (011) 4962-6666 / 2247
- Hospital "A. Posadas" Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160

¿Dudas? ¿Consultas?

0800-333-3532 (ELEA PHOENIX)

Anmat responde: 0800-333-1234

Presentación: Envases conteniendo 20 gramos de crema.

¿Cómo guardar este medicamento?

Modo de conservación:

Conservar a temperatura ambiente entre 20 °C y 25 °C.

Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento.
MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

Esp. Med. Aut. por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 58.833.

LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A., Avda. Gral. Lemos N° 2809,
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires.

Director Técnico: Alfredo J. Boccardo, Farmacéutico.



Fecha de la última revisión: Octubre 2018

505603-00