## Hedera Helix / Benzocaína

## CEDRIC Pocket



## Venta Libre - INDUSTRIA ARGENTINA

Cada caramelo contiene: Extracto de hojas de hiedra desecadas (Hedera Helix) 65 mg; Benzocaína 10 mg. Ingredientes inactivos: azúcar: alucosa líquida. Este medicamento es Libre de Gluten.

Acción terapéutica

Mucolítico - Analgésico bucofaríngeo.

Uso del medicamento

Lea detenidamente esta información: está indicado para el alivio sintomático de estados gripales que cursen con tos y dolor de garganta.

Cómo usar este medicamento

En adultos y mayores de 12 años puede utilizarse 1 caramelo 2 veces por día (130 mg de Extrácto seco de Hedera Helix).

Pueden ingerirse como máximo diariamente: 4 caramelos (40 mg de Benzocaína). Los caramelos se dejan disolver lentamente en la boca, también pueden masticarse. Si los síntomas persisten por más de 5 días o empeoran, consulte a su médico para reevaluar el cuadro respiratorio y el tratamiento.

La duración del tratamiento no debe ser mayor a 7 días.

Advertencias y precauciones

Antecedentes de hipersensibilidad o intolerancia conocida al extracto seco de hojas de hiedra desecadas, a la Benzocaína o a cualquiera de los componen-

En caso de empeoramiento de los síntomas respiratorios, malestar persistente, o aparición de insuficiencia respiratoria, fiebre o expectoración purulenta o con sangre, se debe consultar al médico de inmediato. El agente extractivo etanol al 30% (p/p) sirve para obtener el extracto efectivo para el tratamiento a partir de las hojas de hiedra. El proceso de desecación que se aplica con posterioridad elimina completamente del extracto el contenido de alcohol.

amamantando, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Uso en pediatría: no se recomienda su uso en pediatría.

No administrar en pacientes con edad avanzada pues la Benzocaína produce toxicidad en ese

Si aparecen signos de intoxicación deberá suspenderse su administración. Debido al riesgo de efectos adversos sistémicos cuando los anestésicos locales son absorbidos rápidamente. deberá evaluarse la relación costo-beneficio cuando este medicamento debe ser aplicado

Benzocaína y sus metabolitos pueden antagonizar la actividad antibacteriana de las sulfamidas. Los inhibidores de la colinesterasa plasmática pueden inhibir la metabolización de Benzocaína. Sobredosificación

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

Para otras consultas: Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix 0800-333-3532. Presentación

Caramelos: envases conteniendo 9 y 144 caramelos. Esta última se presenta en dispenser de 16 blísters por 9 caramelos.

MANTENER ÉSTE Y OTROS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LEA ATENTAMENTE LAS INDICACIONES Y ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Conservación: conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz.

E.M.A.M.S. Certificado Nº 54.471. DT: Farm. Laura A. B. Hernández. Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos Nº 2809, Los Polvorines, Pcia. de Bs. As., Argentina. Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 0800-333-3532 | elea.com

Fecha de última revisión: Abril/2008

**E**Flea