

PERVINOX[®]

CLORHEXIDINA



CLORHEXIDINA DIGLUCONATO

INDUSTRIA ARGENTINA
Venta Libre

Jabón líquido
USO PROFESIONAL EXCLUSIVO.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO:

¿Qué contiene Pervinox[®] Clorhexidina?

Cada 100 mililitros contiene: Clorhexidina Digluconato (equivalente a 20 gramos de solución de Clorhexidina Digluconato 20%) 4,0 gramos. Excipientes: glicerina, hidroxipropilmetilcelulosa, alcohol isopropílico, rojo punzó 4R, esencia de potpourri, glucono delta lactona, óxido de cocamina, agua purificada.

Este medicamento es Libre de Gluten.

Acciones:

Desinfectante - Antiséptico.

¿Para qué se usa Pervinox[®] Clorhexidina?

- Se usa para antisepsia (desinfección) general de la piel y en caso de pequeñas heridas, cortes superficiales, quemaduras leves o rozaduras.
- Se usa para el lavado prequirúrgico de manos y antebrazos de los profesionales de salud antes de una cirugía.
- Se usa para el lavado de manos del personal de sanidad.
- Se usa para la preparación de la piel del paciente antes de la cirugía y cuidado post quirúrgico. Baño prequirúrgico y postquirúrgico del paciente.

¿Qué personas no pueden usar Pervinox[®] Clorhexidina?

No utilizar este medicamento en caso de alergia a alguno de los componentes del producto.

¿Qué cuidados debo tener antes de usar este medicamento?

- No utilizar simultánea o sucesivamente con otros desinfectantes o antisépticos. El uso de este medicamento en caso de embarazo o lactancia deberá quedar a criterio médico. Únicamente para uso externo.
- No poner en contacto con tejido nervioso (cerebro, meninges, etc.) y oído medio. No debe utilizarse como desinfectante en zonas de punción o inyección.
- No utilizar en el área genital.
- No utilizar como preparación prequirúrgica de la piel de la cabeza o de la cara.
- No utilizar en menores de 5 años, sin autorización médica.
- En el uso hospitalario antisepsia de piel, o lavado prequirúrgico: utilizar con precaución en neonatos, especialmente en niños prematuros (< 32 semanas de gestación o con < 2 semanas de vida) ya que podría causar quemaduras químicas en la piel.
- Puede causar lesiones oculares graves y permanentes si se coloca o se mantiene en el ojo durante procedimientos quirúrgicos o puede causar sordera cuando se instila en el oído medio a través de tímpanos perforados. Si la solución toma contacto con estas áreas, enjuague inmediatamente con abundante agua.
- Las heridas que involucran a capas más profundas de la piel no deben ser tratadas con este producto.
- No debe realizarse la limpieza general de la piel en zonas extensas del cuerpo. La Clorhexidina es incompatible con

el jabón y otros agentes aniónicos. Los blanqueadores con base de lavandina pueden formar manchas marrones en las telas que han estado en contacto con preparados de Clorhexidina. Se han detectado reacciones alérgicas graves, aunque poco frecuentes, con antisépticos conteniendo Gluconato de Clorhexidina. Se aconseja prestar especial atención si alguna vez ha tenido una reacción alérgica con cualquier antiséptico. En caso de notar algún síntoma inusual, busque atención médica inmediata.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando este medicamento?

Ante la aparición de irritación, sensibilización o reacciones alérgicas (hinchazón de labios, lengua o cara, dificultad para respirar, urticaria), suspender su empleo. Si una solución de Clorhexidina entra en contacto con los ojos, lavar muy bien con agua de inmediato.

¿Cómo se usa este medicamento?

Únicamente para uso externo.

Antisepsia general de heridas y de la piel: colocar sobre la herida humedecida previamente, una pequeña cantidad de Pervinox® Clorhexidina suficiente para hacer espuma y luego enjuagar con abundante agua. Realizar el lavado hasta 2 veces por día. Si la lesión no mejora o empeora en 48 h, suspenda la medicación y consulte con el médico. No utilizar por más de 5 días. **Preparación de la piel del paciente antes de la cirugía:** de modo orientativo en general se recomienda: lavar todo el cuerpo (baño o ducha) por lo menos 2 veces, habitualmente el día antes y el día de la operación del siguiente modo: día previo: lavar con 25 ml de Pervinox® Clorhexidina jabón líquido desde la cara y en sentido descendente, prestando atención a las áreas circundantes de la nariz, axilas, ombligo, ingle y perineo. A continuación, enjuagar y repetir el lavado con otros 25 ml, incluyendo el cabello. Finalmente enjuagar y secar con una toalla limpia. Este procedimiento se repetirá al día siguiente. Luego, una vez que el paciente está en el quirófano, se realiza la desinfección habitual del quirófano. **Antisepsia post operatoria de la piel del paciente:** lavar el cuerpo en forma completa, excepto la herida, en el baño o ducha, usualmente al tercer día luego de la cirugía, utilizando el procedimiento descrito anteriormente. Lavado prequirúrgico de manos en personal de sanidad: mojar las manos y los antebrazos, aplicar 5 ml de Pervinox® Clorhexidina y lavar durante un minuto, pasándose un cepillo o una espátula debajo de las uñas. Enjuagar, aplicar 5 ml más de Pervinox® Clorhexidina y volver a lavar durante dos minutos más. Enjuagar bien y secar. Lavado antiséptico de manos en personal de sanidad: mojar las manos y los antebrazos, aplicar 5 ml de Pervinox® Clorhexidina y lavar durante 1 minuto. Enjuagar bien y secar.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si usé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica: Hosp. de Pediatría Dr. R. Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hosp. Dr. A. Posadas. Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
Hosp. Gral. de Agudos Dr. J. A. Fernández. Tel.: (011) 4808-2655.
Ctro. de Asistencia Toxicológica La Plata. Tel.: (0221) 451-5555.

¿Tiene usted alguna pregunta?

ANMAT Responde 0800-333-1234.

Forma de conservación:

conservar a temperaturas no mayores de 30°C.

Presentaciones

Se presenta en envases con 200 ml y 500 ml.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad Medicinal Autorizada
por el Ministerio de Salud. Certificado N° 46.378. DT: Farm. Laura A. B.
Hernández. Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809,
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Centro de Atención
telefónica: 0800-333-3532 | elea.com
Fecha de la última revisión: Enero/2019

