

Fórmula: Cada 100 ml contiene: hexetidina 0,100 g. Exc.: alcohol etílico; ácido cítrico; tween 80; sacarina sódica; esencias de clavo; anís y menta; salicilato de metilo; mentol; eucaliptol; colorante rojo FD&C N° 2; agua purificada c.s. Contenido de alcohol etílico: 8,067 % p/v.

Acción terapéutica: Antibacteriano, antimicótico, bactericida y antiséptico local. Potencialmente activo sobre diversos gérmenes gram + y gram - : estreptococos, estafilococos, colibacilos y candida albicans. El principio activo se fija sobre las mucosas desde donde se libera progresivamente.

Indicaciones: Tratamiento local de las afecciones de la cavidad oral y de la orofaringe; estomatitis; postoperatorios; encías sensibles y sangrantes.

Posología y administración: Dos o tres buches o gárgaras por día con una cucharada sopera (15 ml) de Duranil® puro (sin diluir) durante 30 segundos.


Vía de administración: Oral local, solamente bajo la forma de buches o gárgaras.

Precauciones y advertencias: NO INGERIR. Las indicaciones no justifican un uso prolongado que provocaría un desequilibrio de la flora microbiana normal de la cavidad oral, con riesgo de difusión bacteriana o fúngica. El tratamiento usual no se prolongará por más de 10 (diez) días a partir de entonces deberá reevaluarse la conducta a seguir.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la droga. Niños menores de 7 años. Primer trimestre del embarazo.

Duranil®

HEXETIDINA - SOLUCION



Cont. Neto 200 ml VTA. LIBRE - INDUSTRIA ARGENTINA

Lea atentamente esta información. Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Esp. Med. aut. por el M.S. - Certificado N° 24.401.
Elaborado en Calle 3 s/Nro. esquina 103, Pque.
Industrial Norte, San Luis, Pcia. de San Luis.
Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A.,
Sanabria 2353, CABA.
Director Técnico: Isaac J.
Nisenbaum, Farmacéutico.

**Conservar entre 2 y 25 °C.
Proteger de la luz.**

**Mantener éste y todos los
medicamentos fuera del
alcance de los niños.**

Bajo Licencia W.L.



500135-00 1-ff-i