

STD 117
95x75x30


Indicaciones: tratamiento sintomático de la constipación. **Dosis:** adultos y niños mayores de 12 años: 1 a 2 chicles. **Niños menores de 12 años:** consultar a su médico. **Administración:** mascar a la hora de acostarse.
Fórmula: Cada *chicle laxante* contiene: Picosulfato de sodio 5 mg. Excipientes: gelaína AAA, azúcar refinada, ámbido de maíz, esencia de menta, cera carnaúba, núcleo de goma sabor menta. **Acción terapéutica:** laxante estimulante. Modifica el intercambio hidroelectrolítico intestinal y estimula la motricidad colónica. **Precauciones y advertencias:** no es una golosina. El tratamiento medicamentoso de la constipación no es más que un adyuvante del tratamiento higiénico dietético. **Feen-a-Mint®** no debe administrarse en forma prolongada ni a dosis mayores que las recomendadas en pacientes bajo tratamiento diurético, digitalico, hipotensor, o en caso de constipación severa, o la enfermedad de los laxantes con colopatía funcional severa, melancolía, neurasias en caso de dependencia de laxantes que requiere de ingesta regular de laxantes, aumentando la psicología de dependencia. **La utilización prolongada de laxantes se desaconseja:** no exceder de 8 a 10 días de tratamiento. El uso excesivo de laxantes puede provocar situación de dependencia que requiere de ingesta regular de laxantes, aumentando la psicología de dependencia. Cuando tenga dolores de vientre, de estómago, náuseas o vómitos, no tome laxantes sin consultar a su médico. **Contraindicaciones:** antecedentes de hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los integrantes de la fórmula. **Colopatías orgánicas complementarias** (enfermedad de Crohn, rectorrinitis ulcerosa), síndrome ocular o subocclusivo, **Interacciones:** síntomas dolorosos abdominales sin diagnóstico. Pacientes con cuadros abdominales agudos (por ej. obstrucción intestinal), **Interacciones:** antiácidos, antidiuréticos, antihistamínicos (tipo quinina), solatol, amiodarona, vinclamina, digitalicos. **Drugs hipokalemiantes** (antibióticos B, corticoides y diuréticos hipokalemiantes, sales o asociados). **Efectos adversos:** puede observarse molestias abdominales de tipo cólico. El uso prolongado o una sobredosis puede provocar diarrea con pérdida excesiva de agua y electrolitos particularmente potasio; desarrollo de un colón atónico no funcional. Puede provocar dolores abdominales o diarrea, espasmodicamente en personas con colón irritable. Su administración prolongada y en dosis elevadas puede producir pérdidas de potasio e hipokalemia. **Sobredosis:** en caso de sobredosis accidental se recomienda consultar con un Centro Toxicológico. Hosp. de Niños Ricardo Gutiérrez; Tel. (011) 4962-6666 - Hosp. Posadas; Tel. (011) 4658-7777. Centro Nec. de Intoxicaciones: Tel. 0800-3330160. **Presentaciones:** envases conteniendo 6 y 18 chicles.

Feen-a-mint®
Picosulfato de sodio
Chicle Laxante
18 Unidades
Sabor Menta

18
Unidades
Sabor Menta
Feen-a-mint®

Chicle Laxante
Picosulfato de sodio

ZONA DE CODIFICADO



7 1762855 019141

Feen-a-mint
Chicle Laxante x 18 chicles
Estuche Venta
501914-00
2013-10-11
Circuito 7363
Laura Celmi



Esp. Med. aut. por el M.S. - Certificado N° 6.066
Elaborado en Calle 3 s/Nro. esquina 103, Pque. Industrial Norte,
San Luis, Pcia. de San Luis.
Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A., Sanabria 2353, CABA.
Director Técnico: Isaac J. Nisenbaum, Farmacéutico.

18
Unidades
Sabor Menta
Feen-a-mint®

Chicle Laxante
Picosulfato de sodio

Feen-a-mint®


Picosulfato de sodio

Chicle
Laxante

18
Unidades
Sabor Menta



Industria Argentina Venta Libre



7 1762855 019141

501914-00
S -117
95 x 75 x 30
1-16-1

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.
Conservar a menos de 30°C (preferentemente entre 15°C y 25°C)



7 1762855 019141

