

Flevomax®

Fracción flavonoide purificada
micronizada Diosmina/Hesperidina
(90/10) 500 mg

Comprimidos Recubiertos

Industria Argentina - Venta bajo receta

Fórmula:

Cada comprimido recubierto contiene: Núcleo: Fracción flavonoide purificada micronizada Diosmina/Hesperidina (90/10) 500 mg. Excipientes: Celulosa microcristalina, Croscarmelosa sódica, Estearato de magnesio. Cubierta: Polietilenglicol, Hidroxipropilmetilcelulosa, Dióxido de titanio, Óxido férrico amarillo, Óxido férrico rojo.

Acción Terapéutica:

Venotónico y vaso protector.

Indicaciones:

Tratamiento de las manifestaciones de la insuficiencia venosa crónica de los miembros inferiores: sensación de pesadez, dolor de piernas, calambres nocturnos. Tratamiento de los signos funcionales asociados a la crisis hemorroidal.

Acción Farmacológica:

Ejerce un efecto protector y tónico sobre el sistema vascular de retorno:

- A nivel de las venas disminuye la distensibilidad venosa y reduce la estasis venosa.
- A nivel de la microcirculación, normaliza la permeabilidad capilar y refuerza la resistencia capilar, sobre todo en aquellos pacientes con signos de fragilidad capilar.

Posología:

Dos comprimidos al día, por la mañana con el desayuno.
En crisis hemorroidal: comenzar con una dosis de 6 comprimidos diarios, repartidos en tres tomas, hasta la remisión del cuadro agudo, estableciendo entonces un tratamiento de sostén de 2 comprimidos al día, durante 2-3 semanas a criterio médico.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad conocida o sospechada a alguno de los componentes.
Primer trimestre del embarazo.

Advertencias:

La administración de Flevomax® en la crisis hemorroidal no excluye el tratamiento específico de la patología anal.

Precauciones:

Embarazo: Si bien los estudios experimentales en animales no han mostrado efectos teratogénicos y hasta el momento no se ha descrito ningún efecto nocivo en la especie humana, esto es insuficiente para excluir todo riesgo, por lo cual se desaconseja su administración en el primer trimestre del embarazo. En el segundo y tercer trimestre, el médico evaluará el riesgo/beneficio.

Lactancia: Debido a la ausencia de conocimientos sobre el paso a la leche materna, se desaconseja su uso durante la lactancia.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS EN SU ENVASE ORIGINAL Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Interacciones Medicamentosas:

No se describen.

Reacciones Adversas:

Se han descrito algunos casos de trastornos digestivos leves y trastornos neurovegetativos que no obligaron nunca a la interrupción del tratamiento.

Sobredosificación:

Hasta la fecha no se han reportado casos de sobredosis no tratadas. Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247
- Hospital A. Posadas. Tel.: (011) 4654-6648 / 658-7777
- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-3330160

Para otras consultas:

Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea **0800-333-3532**

Condiciones de Conservación y Almacenamiento:

Conservar entre 15 °C y 30 °C, en envase perfectamente cerrado.

Presentaciones:

Envases conteniendo 20, 30, 50 y 60 comprimidos recubiertos.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nº 51.155.

Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A. Sanabria 2353, CABA.

Director Técnico: Fernando G. Toneguzzo, Farmacéutico.

503289-01

1-sm-g

