

# Nopucid®

## IVER

### IVERMECTINA 0.5% LOCIÓN



## Loción Pediculicida Uso Externo

Venta Bajo Receta  
INDUSTRIA ARGENTINA

**Lea atentamente esta información antes de comenzar a utilizar este medicamento.**

Conservar este prospecto. Puede necesitar leerlo nuevamente.

Si tiene preguntas adicionales, consulte con su médico de cabecera.

Este medicamento ha sido prescripto para Ud., no lo comparta con otros. Podría perjudicarlos.

Si alguno de los efectos adversos se hace importante o si Ud. nota cualquier efecto colateral que no esté documentado en este prospecto, por favor hacerlo saber a su médico.

### Contenido del prospecto

1. ¿Qué es **Nopucid® Iver** y para qué se utiliza?
2. Antes de usar **Nopucid® Iver**.
3. ¿Cómo utilizar **Nopucid® Iver**?
4. ¿Cuáles son los posibles efectos adversos de **Nopucid® Iver**?
5. Conservación de **Nopucid® Iver**.
6. Contenido del envase e información adicional.

### 1. ¿Qué es **Nopucid® Iver** y para qué se utiliza?

**Nopucid® Iver** es una loción pediculicida que contiene Ivermectina y se utiliza para el tratamiento tópico, externo de los piojos de la cabeza en niños mayores de 5 años.

La Ivermectina es un ingrediente farmacéutico activo que provoca la inmovilización y muerte del piojo al unirse a sitios específicos del parásito comprometiendo su conducción nerviosa y función muscular.

### 2. Antes de usar **Nopucid® Iver**

- **No debe aplicarse **Nopucid® Iver****: si Ud. o el niño es alérgico (hipersensible) a cualquiera de los componentes del producto.

- Si Ud. o el niño tiene el cuero cabelludo lastimado, irritado o con eccemas (afecciones en la piel que causan picazón).

**Tenga especial cuidado con **Nopucid® Iver****: por favor, informe a su médico si padece algún otro trastorno o enfermedad, ya que su médico puede necesitar tenerlo en cuenta.

- No aplique **Nopucid® Iver**, loción pediculicida, ni lo conserve cerca de donde hay fuentes de calor o una llama. Puede provocarle daño.
- Mantener éste medicamento fuera del alcance de los niños. **Nopucid® Iver**, loción pediculicida, no debe ser ingerido. Este producto debe ser administrado en niños bajo la supervisión cercana de un adulto responsable.
- Evite el contacto con los ojos, nariz y boca.

### Fertilidad, Embarazo y Lactancia

No existe evidencia sobre la seguridad en el uso de **Nopucid® Iver**, loción pediculicida, en el embarazo. Solo podrá ser utilizado durante el embarazo si el beneficio justifica los riesgos potenciales.

No ha sido evaluada la excreción de Ivermectina en la leche materna cuando se aplica localmente. Cuando es administrada por vía oral se excreta en leche a bajas concentraciones. Por lo tanto, se deberá evaluar la relación beneficio / riesgo antes de la aplicación a una mujer que se encuentra amamantando.

### 3. ¿Cómo utilizar **Nopucid® Iver**?

Siga las instrucciones de administración indicadas por su médico o farmacéutico. En el caso de que tenga dudas consúltelo nuevamente.

Recuerde que **Nopucid® Iver**, loción pediculicida, es solo para uso tópico en el pelo y cuero cabelludo en niños mayores de 5 años de edad.

A modo de sugerencia:

- Aplicar una cantidad suficiente de **Nopucid® Iver**, loción pediculicida, sobre el cabello seco, hasta cubrir completamente el cabello y el cuero cabelludo (puede ser necesario utilizar todo el envase de acuerdo a la longitud del cabello).
- Dejar actuar **Nopucid® Iver**, loción pediculicida, durante 10 minutos.
- Una vez cumplidos los 10 minutos, enjuagar con abundante agua.
- Lavarse las manos luego de la aplicación.
- Evitar el contacto con los ojos, nariz y boca. En caso de contacto accidental, enjuagar con abundante agua.

Se sugiere además acompañar al tratamiento de **Nopucid® Iver**, loción pediculicida con:

- El uso del peine fino: de este modo le ayuda a remover las liendres y los piojos.
- Lavado con agua caliente (o limpiado a seco) de la ropa recientemente utilizada, toallas, sábanas y gorras / sombreros.

- Lavado con agua caliente de peines, cepillos, hebillas, entre otros.
- Revisación del resto de los miembros de la familia con riesgo de contagio. Consultar si es necesario para evaluar el tratamiento adecuado.

### Si se expone accidentalmente a Nopucid® Iver

Si usted sufre una exposición accidental a **Nopucid® Iver**, loción pediculicida, (ingestión, inhalación, exposición a grandes superficies de la piel, entre otras) fuera de la recomendada más arriba, **consulte inmediatamente con su médico. Puede necesitar atención médica.** Ante este tipo de casos se han observado los siguientes efectos adversos: piel brotada, hinchazón del cuerpo, dolor de la cabeza, mareo, tendencia al sueño, dificultad para realizar movimientos, cansancio, ganas de vomitar, vómitos y diarrea. Menos frecuentemente: convulsiones, sensación de falta de aire, dolor de panza, cosquilleo en brazos y piernas, urticaria y lesiones en la piel.

Ante la eventualidad de una exposición accidental, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse a los Centros de Toxicología:

- **Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez**  
Tel.: (011) 4962-6666/2247
- **Hospital Alejandro Posadas**  
Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777
- **Centro Nacional de Intoxicaciones**  
Tel.: 0800-333-0160

Para otras consultas: Centro de atención telefónica del Laboratorio Elea Phoenix **0800-333-3532**.

### 4. ¿Cuáles son los posibles efectos adversos de Nopucid® Iver?

Al igual que todos los medicamentos, **Nopucid® Iver**, loción pediculicida puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los van a presentar. No obstante, estos efectos son poco frecuentes con la aplicación tópica de Ivermectina.

Consulte con su médico si usted tiene alguno de los siguientes efectos adversos durante el tratamiento:

- Conjuntivitis, "ojo rojo".
- Sensación de quemazón en la piel y cuero cabelludo, caspa.
- Picazón en la piel, sequedad en la piel y piel enrojecida.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si presenta cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

### 5. Conservación de Nopucid® Iver

Conservar a temperatura menor de 25°C.  
No aplicar **Nopucid® Iver**, loción pediculicida, ni conservar cerca de fuentes de calor con llama.

### 6. Contenido del envase e Información adicional.

#### Composición de Nopucid® Iver

El principio activo es Ivermectina.  
Cada 100 ml de **Nopucid® Iver**, loción pediculicida, contiene: 0.5 gramos de Ivermectina.  
Los demás componentes son: polisorbato 80, butilhidroxitolueno, propilparabeno, metilparabeno, alcohol etílico, alcohol isopropílico, triglicéridos de cadena media. **Este producto es Libre de Gluten.**

### Presentaciones de Nopucid® Iver

**Nopucid® Iver**, loción pediculicida, se presenta en envase conteniendo 60 mililitros.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. MANTENER EN EL ENVASE ORIGINAL.**

**Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.**

**"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la Ficha que está en la página Web de la ANMAT:**

**<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> ó llamar a ANMAT Responde 0800-333-1234".**

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 57.395.

Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica.  
Laboratorio Elea Phoenix S.A. Av. Gral. J.G. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica **0800-333-3532** | **elea.com**

Fecha de última revisión: Diciembre/2019



**Elea**