

Tratamiento de las lesiones
provocadas por el acné



Adermicina® Adapaleno 0,1%

Tratamiento
ANTI-ACNÉ

VENTA LIBRE - INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE APLICARSE ESTE MEDICAMENTO.

Conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene ADERMICINA® ANTI-ACNÉ? Cada 100 gramos de gel contiene: Ingrediente activo: Adapaleno 0,1 gramos. Ingredientes inactivos: carbopol 940, propilenglicol, poloxamer 188, EDTA disódico, metilparabeno, fenoxietanol, hidróxido de sodio, agua purificada. **Este medicamento es Libre de Gluten.**

Acción: Anti-acné.

¿Qué es ADAPALENO? El ADAPALENO pertenece al grupo de los retinoides tópicos que disminuye la formación de comedones (puntos negros) y reduce el componente inflamatorio del acné vulgar.

¿Para qué se usa ADERMICINA® ANTI-ACNÉ? Para el tratamiento de las lesiones cutáneas del acné vulgar que se encuentran en el pecho, en la espalda y sobre el rostro (cara), cuando predominan los comedones, las pápulas y las pústulas, en personas mayores de 12 años.

¿Qué personas no pueden utilizar ADERMICINA® ANTI-ACNÉ? NO USE este medicamento si usted: • Es alérgico al principio activo ADAPALENO o a cualquiera de sus otros componentes. • Está embarazada o dándole el pecho a su bebé. • Menores de 12 años.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar ADERMICINA® ANTI-ACNÉ? Consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento con ADERMICINA® ANTI-ACNÉ si Ud.: • Está embarazada o sospecha que puede estarlo. No se aconseja la aplicación de este medicamento durante el embarazo. Se ha demostrado que algunos de los otros medicamentos retinoides causan defectos durante la gestación, aunque no hay evidencia específica de que ADAPALENO al 0,1% durante el uso local cause defectos en los bebés cuando se utiliza tópicamente como indica este prospecto. • Se encuentra dándole el pecho a su bebé. • Tiene la piel dañada (cortes, abrasiones, eccemas, quemaduras de sol).

Recuerde que es sólo para uso local, externo. Recuerde que no se debe utilizar más de una vez por día. Aplicar más de lo indicado no proporcionará mejor resultado o que este sea más rápido. Si puede empeorar la irritación de la piel. Es necesario que cuando utilice este medicamento limite la exposición al sol, incluyendo el uso de camas solares. Use protección solar al salir al aire libre. Evite depilarse en las zonas donde se encuentre utilizando el medicamento. Durante las primeras semanas de uso, su acné puede que parezca que empeoró. Esto es habitual que suceda. Continúe utilizando ADERMICINA® ANTI-ACNÉ según las indicaciones y sólo suspenda la aplicación en caso de irritación de grado severo. Si la irritación se vuelve severa o si no hay ninguna mejoría luego de 3 meses de uso, consulte con su médico. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebe, consulte a su médico o farmacéutico antes de aplicarse este medicamento.

Aplicación de ADERMICINA® ANTI-ACNÉ con otros medicamentos. No se conocen interacciones por el uso de otros medicamentos tópicos junto con ADERMICINA® ANTI-ACNÉ. Sin embargo, otros medicamentos retinoides o con un mecanismo de acción similar no deberían utilizarse al mismo tiempo que ADERMICINA® ANTI-ACNE. Cómo ADERMICINA® ANTI-ACNÉ puede provocar irritación local leve, el uso de otros medicamentos con acción deshidratante, astringente o abrasiva puede potenciar la irritación sobre la piel.



¿Cómo se aplica ADERMICINA® ANTI-ACNÉ?



Para aplicar **ADERMICINA® ANTI-ACNÉ** siga los siguientes pasos:



Limpie suavemente las áreas afectadas (las áreas de la cara, pecho y/o espalda) donde tiene las lesiones, asegurando que queden bien secas.



Aplique una capa delgada de **ADERMICINA® ANTI-ACNÉ** sobre las áreas afectadas de la piel una sola vez por día. Es mejor hacerlo por la noche antes de acostarse.



Por ejemplo, si tiene acné en la cara, primero limpie y seque. Posteriormente aplique una capa delgada sobre la cara. No debe ser solamente aplicado este gel sobre una sola lesión, sino que debe distribuirse por el resto del rostro.



Lave sus manos luego de aplicarse **ADERMICINA® ANTI-ACNÉ**. Evite colocar **ADERMICINA® ANTI-ACNÉ** sobre los ojos, labios, membranas mucosas, ángulos de la nariz. Si ocurre lavar inmediatamente el área con agua. No aplicar sobre la piel que está dañada (cortes, abrasiones, eccemas, quemaduras de sol).

En general la mejoría ocurre luego de 4 a 8 semanas y puede ofrecer una mejoría adicional después de 3 meses de ser aplicada.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy aplicando este medicamento? Como todos los medicamentos **ADERMICINA® ANTI-ACNÉ** puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas lo sufren. La mayoría de los eventos indeseables ocurren en la piel. Lo más probable es que ocurra irritación (enrojecimiento, picazón, sequedad y ardor) sobre todo durante las primeras semanas de uso. La irritación suele disminuir con el uso continuo de este medicamento. La irritación en la piel puede ser mayor si utiliza otro medicamento tópico para tratar el acné junto con **ADERMICINA® ANTI-ACNÉ**. Otros eventos indeseables son: dermatitis, quemadura de sol, picazón, descamación, hinchazón, enrojecimiento y/o edema del párpado. Si aparecen síntomas compatibles con una reacción alérgica (como picor, erupción cutánea, urticaria, hinchazón de los labios, párpados y dificultad para respirar), discontinúe el uso y concurra inmediatamente a su médico especialista en Dermatología.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, ingestión o si apliqué más cantidad de la necesaria? Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:
• Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247. • Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777. • Hospital de Niños Pedro Elizalde: (011) 4300-2115. • Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Evitar el contacto de este medicamento con los ojos, labios y boca. Si ocurre, lavar inmediatamente el área con agua.

¿Dudas? ¿Consultas? 0800-333-3532 (ELEA). ANMAT responde: 0800-333-1234.

Conservación: Conservar a temperatura ambiente, desde 20°C hasta 25°C.

Mantener en su envase original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. No usar si la tapa o el pomo no se encuentran intactos.

Presentaciones: envases conteniendo 30 gramos de gel.

MANTENER ESTE Y OTROS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y / O FARMACÉUTICO.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 53.568.

Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica. Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica: 0800-333-3532 | elea.com

Fecha de última revisión: Noviembre/2021

508721-00 1-pm-ep

Elea