

Benadryl[®]

Loratadina 24Flash^{VL}

ANTIALÉRGICO **Rápida Disolución**

Comprimidos desleíbles sabor *Cherry* - Venta Libre - **INDUSTRIA ARGENTINA**

Composición

Cada comprimido desleíble contiene: Loratadina 10 mg. Excipientes: manitol; polivinilpirrolidona K30; aspartamo; sabor cereza; estearil fumarato de sodio; crospovidona; lactosa anhidra; dióxido de silicio coloidal; colorante rojo 40 laca. Este Medicamento es Libre de Gluten. Contiene Lactosa.

Acción terapéutica

Antihistamínico (antialérgico).

Uso del medicamento

Lea atentamente esta información:

BENADRYL[®] 24 VL FLASH está indicado para el tratamiento sintomático y alivio temporario de síntomas causados por la alergia estacional u otras alergias de las vías aéreas superiores: secreción nasal, estornudos, ojos llorosos e irritados, picazón de nariz y/o garganta. Está indicado en caso de alergia de la piel, previo diagnóstico médico.

Posología

Instrucciones

Colocar el comprimido en la boca, se disolverá rápidamente. Puede ser tomado con o sin agua.

BENADRYL[®] 24 VL FLASH provee 24 horas de alivio de síntomas de alergia, sin causar somnolencia.

Sólo un comprimido al día alivia el goteo nasal, los estornudos y los ojos llorosos e irritados. Es seguro y efectivo para adultos y niños mayores de 6 años.

Las tabletas con sabor a cherry se disuelven en su boca.


EDAD	DOSIFICACIÓN
Adultos y niños mayores de 6 años	1 comprimido diario; no suministrar más de 1 comprimido cada 24 hs
Niños menores de 6 años	Consultar con el médico
Pacientes con enfermedad hepática o renal	Consultar con el médico

La duración del tratamiento no debe superar los 5 días ininterrumpidos.

NO



SI



Precaución:

Para evitar la rotura del comprimido desleible al extraerlo del blister, proceda de la siguiente forma: rompa el aluminio como indica el gráfico "SI", una vez roto extraiga el comprimido.

Contraindicaciones

No use este producto si Ud. ha tenido alguna reacción alérgica a alguno de los componentes de la fórmula. Embarazo, lactancia, niños menores de 2 años de edad, pacientes que padecen enfermedad hepática o renal. Crisis asmática.

Precauciones y Advertencias

Consultar con el médico antes de utilizar este producto si usted tiene enfermedad hepática o renal. Su médico deberá determinar si usted necesita una dosis diferente. Suspender el tratamiento 48 horas antes de efectuar cualquier prueba cutánea, ya que los antialérgicos pueden impedir o disminuir reacciones que, de otro modo, serían positivas. Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina. En embarazo y lactancia, consultar con un profesional de la salud antes de su uso.

Reacciones Adversas

Ocasionalmente puede producir cansancio, sedación o dolor de cabeza. En pacientes pediátricos se ha observado nerviosismo.

0800-22-ALERGIA

Dudas ó Consultas? (25374)

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o con su farmacéutico. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Sobredosificación

En caso de sobredosificación consulte a un médico y contacte inmediatamente a los Centros de Toxicología:
- HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- HOSPITAL A. POSADAS: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
- CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: Tel.: 0800-333-0160.

Presentaciones

Envase conteniendo 10 comprimidos desleibles.
No lo use si el blister conteniendo el comprimido se encuentra abierto o rasgado.
Conservar a no más de 30°C en su envase original.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 52.748.
Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica. Elaborado por Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Para mayor información comunicarse con Centro de Atención telefónica **0800-333-3532 | elea.com**

Fecha de última revisión: Febrero/2007
502890-02 3-pm-ep

