

Benadryl[®]

Loratadina 24h VL

ANTIALÉRGICO

Comprimidos
Venta Libre - INDUSTRIA ARGENTINA

Composición

Cada comprimido contiene: Loratadina 10 mg. Excipientes: lactosa monohidrato; polivinilpirrolidona K30; dióxido de silicio coloidal; estearato de magnesio; celulosa microcristalina PH102; croscarmelosa sódica. **Este medicamento es Libre de Gluten. Contiene Lactosa.**

Acción terapéutica

Antihistamínico (antialérgico)

Uso del medicamento

Lea atentamente esta información:

BENADRYL[®] 24 VL está indicado para el tratamiento sintomático y alivio temporario de los síntomas causados por alergias respiratorias, tales como: secreción nasal, estornudos, lagrimeo, y picazón de ojos, nariz y/o garganta. Está indicado en caso de alergia de la piel, previo diagnóstico médico.

Posología

Cómo usar este medicamento:

Adultos y niños mayores de 12 años: un comprimido diario. No ingerir más de un comprimido cada 24 horas. La duración del tratamiento no debe superar los 5 días ininterrumpidos.

En caso de enfermedad hepática o renal: pregunte a su médico.

Contraindicaciones

No use este producto si Ud. ha tenido alguna reacción alérgica a este producto o a cualquiera de sus componentes. Embarazo, lactancia, niños menores de 2 años de edad, pacientes que padecen enfermedad hepática o renal. Crisis asmática.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico antes de usarlo si Ud. tiene alguna enfermedad hepática o renal. Su médico determinará si Ud. necesita una dosis diferente.

Cuando Ud. use este producto no ingiera más de la dosis recomendada. Ingerir una dosis mayor a la dosis recomendada puede causar somnolencia.

En caso de una alergia grave, con dificultad respiratoria, hinchazón de cara y/o manos, detenga el uso del producto y consulte inmediatamente a su médico.

Suspender el tratamiento 48 horas antes de efectuar cualquier tipo de prueba cutánea, ya que los antialérgicos pueden impedir o disminuir las reacciones que, de otro modo, serían positivas.

0800-22-ALERGIA

Dudas ó Consultas? (2 5 3 7 4)

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o con su farmacéutico.

Sobredosis

En caso de sobredosificación consulte a un médico y contacte inmediatamente a los Centros de Toxicología:

- HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- HOSPITAL A. POSADAS: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
- CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: Tel.: 0800-333-0160.

No lo use si el blister conteniendo el comprimido se encuentra abierto o rasgado.
Almacenar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C.

Presentación

Envase conteniendo 10 comprimidos.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 52.748.

Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica.

Elaborado por Laboratorio Elea Phoenix S.A.,

bajo licencia exclusiva de Warner Lambert Co. USA.

Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica

0800-333-3532 | elea.com

Fecha de última revisión: Enero/2006
502889-02 3-pm-ep



Bajo Licencia W.L.



Elea