



Solución Oftálmica Estéril

Venta Libre - INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR USUALIX®, SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL

Conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene USUALIX®?

Cada mililitro de **Usualix®** contiene: Principio Activo: Tetrahidrozolina Clorhidrato 0,50 miligramos. Principios Inactivos (Excipientes): cloruro de benzalconio, edetato disódico dihidratado, ácido bórico, borato de sodio decahidratado, cloruro de sodio, hidroxipropilmetilcelulosa, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, agua purificada. **Este medicamento es Libre de Gluten.**

Acción: descongestivo ocular.

¿Para qué se usa Usualix®?

Usualix® es un medicamento de uso oftálmico exclusivo, indicado para el rápido alivio temporario del enrojecimiento ocular. Calma el malestar y la irritación ocular leve ocasionados por ejemplo tras la exposición a humo, polvo, agua clorada, luz (ya sea solar, rayos ultravioleta (UV), luz de neón, televisión, como por pantallas de computación), o por corrientes de aire, cosméticos, lentes de contacto, entre otros.

¿Qué personas no pueden recibir Usualix®?

NO USE este medicamento si usted:

- Es alérgico al principio activo (Tetrahidrozolina) o a otro de los principios inactivos de la formulación.
- Es hipersensible/ alérgico a agentes adrenérgicos o a aminas simpaticomiméticas.
- Tiene glaucoma de ángulo estrecho (enfermedad ocular con aumento de la presión intraocular, que puede dañar el nervio óptico).
- Tiene Conjuntivitis microbiana o infecciosa.
- Está en tratamiento con IMAO (antidepresivos como tranilcipromina).
- Está embarazada o amamantando.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento?

No utilizar si el frasco no tiene el precinto de seguridad de la tapa intacto, previo a su uso. Tenga en cuenta que **Usualix®** es una solución oftálmica estéril de uso externo exclusivo, es decir es sólo para uso externo, y solo de aplicación tópica en el ojo.

Consulte a su médico si Ud. tiene:

- Glaucoma.
- Infección microbiana oftálmica.
- Hipertensión arterial.
- Enfermedades del corazón.
- Diabetes.
- Hipertiroidismo.
- Si usa lentes de contacto tenga la precaución de quitárselos antes de aplicar **Usualix®** y colocárselos por lo menos 15 minutos después.
- Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte con su médico antes de utilizar este medicamento.
- Para la aplicación a niños menores de 6 años, consulte con su médico.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando Usualix®?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como aumento del tamaño pupilar (midriasis) temporaria, picazón o ardor ocular (ante el uso excesivo), incremento de la presión ocular. Ocasionalmente se han descrito cefaleas, mareos, temblor, palpitaciones o insomnio. Suspender el tratamiento en esos casos y consultar con su médico. Si Ud. se aplica otros descongestivos o gotas

oftálmicas puede aumentar el enrojecimiento ocular. Si usted toma al mismo tiempo otros medicamentos como:

- Antidepresivos del grupo de los IMAO como tranilcipromina.
- Antihipertensivos (medicación para la presión arterial)
- Hipoglucemiantes orales (medicamentos para el tratamiento de la diabetes) debe consultar a su médico ya que podrían interferir con el uso de **Usualix®**.

Si el disconfort o enrojecimiento persisten por más de 72 horas o empeoran consulte a su médico. Suspenda el uso de **Usualix®** y consulte a su médico si se presentara dolor a nivel ocular, cambios súbitos en la visión, aparición de manchas tipo "moscas" en el campo visual incremento de la irritación ocular, o si la afección persiste luego de 3 días de tratamiento.

¿Cómo se usa este medicamento?

Usualix® es de administración tópica oftálmica. Como posología habitual se sugiere: 1 a 2 gotas en el/los ojo/s afectados, hasta 4 veces al día. El efecto descongestivo es inmediato tras la administración y se mantiene de 4 a 6 horas.

Instrucciones de uso:

1. Lávese bien las manos antes de aplicar **Usualix®**.
2. Abra la tapa del envase. Ante el primer uso rompa el precinto de seguridad.
3. Aplique el producto en el saco conjuntival del/los ojo/s afectado/s evitando que contacte la punta del gotero con el ojo, piel u otras superficies, en caso de utilizar lentes de contacto debe quitárselos antes de la aplicación de **Usualix®** y luego de 15 minutos volver a colocarlos. Sugerencia para la autoadministración de gotas:
 - Incline la cabeza levemente hacia atrás y mire hacia un punto fijo en el techo.
 - Con el dedo índice, presione el párpado inferior hacia abajo con suavidad formando una bolsa, este espacio es el saco conjuntival.
 - Presione el frasco gotero para permitir que la gota caiga en la bolsa o saco conjuntival.
 - Luego de aplicar la gota, cierre sus ojos suavemente sin apretarlos.
 - Oprima levemente la parte interior del ojo (por donde salen las lágrimas). Mantenga sus ojos cerrados, antes de abrirlos limpie suavemente con un pañuelo descartable limpio de papel lágrimas o restos de medicamento no absorbidos.
4. Finalizada la aplicación coloque nuevamente la tapa en el envase.
5. Lávese nuevamente las manos, para evitar transportar posibles restos del medicamento.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?

Ante una sobredosis o ingesta accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:

- **Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez** Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- **Hospital Dr. A. Posadas** Tel.: (011) 4654-6648/(011) 4658-7777.
- **Hospital de Niños Pedro Elizalde** Tel.: (011) 4300-2115.
- **Centro Nacional de Intoxicaciones** Tel.: 0800-3330-160.

¿Dudas? ¿Consultas?

0800-333-3532

ANMAT responde: 0800-333-1234.

Presentaciones:

Frascos goteros conteniendo 10 ml de Solución Oftálmica Estéril.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.

¿Cómo guardar éste producto?

Modo de conservación: conservar en lugar fresco y seco, de preferencia entre 15°C y 30°C. Una vez abierto el envase por primera vez, se recomienda utilizarlo para un tratamiento individual y desecharlo una vez concluido el mismo. Verifique la fecha de vencimiento antes de aplicar este o cualquier medicamento.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 57.266.

Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica. Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Para mayor información comuníquese con el Centro de Atención telefónica **0800-333-3532 | elea.com**
Elaborado en: Valentín Torrã 4880, Pque. Industrial Gral. Belgrano, Pcia. de Entre Ríos.

Fecha de última revisión: Octubre/2013

505057-01

1-jd-la



Elea