

Leflumar[®]

Levofloxacin 500 mg

Levofloxacin 750 mg

Comprimidos recubiertos

Venta bajo receta archivada
INDUSTRIA ARGENTINA



INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Lea atentamente esta información antes de comenzar a tomar / utilizar este medicamento, y cada vez que renueve su receta. Podría contener nueva información. Conserve esta información, puede necesitar leerla nuevamente.

Si tiene preguntas adicionales, consulte con su médico de cabecera. Este medicamento ha sido prescripto para Ud., no lo comparta con otros. Podría perjudicarlos, aun cuando los síntomas sean los mismos que los suyos. Este medicamento sólo debe ser indicado por su médico y prescripto bajo una receta médica archivada. Esta información no reemplaza el hablar con su médico acerca de su enfermedad o tratamiento. Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos no descriptos en este texto.

CONTENIDO DEL PROSPECTO

1. ¿Qué es Leflumar[®] y para qué se utiliza?
2. Antes de usar Leflumar[®].
3. ¿Cómo utilizar Leflumar[®]?
4. ¿Cuáles son los posibles efectos adversos de Leflumar[®]?
5. ¿Cómo debo conservar Leflumar[®]?
6. Contenido del envase e información adicional.

1. ¿Qué es Leflumar[®] y para qué se utiliza?

Leflumar[®] contiene un principio activo llamado Levofloxacin, que pertenece al grupo de medicamentos denominados antibióticos. La Levofloxacin es un antibiótico del tipo de las quinolonas, y funciona matando las bacterias que causan infecciones en su organismo.

- Utilice antibióticos solamente con la prescripción de un médico u odontólogo.
- No se automedique ni ofrezca antibióticos a otras personas.
- Cumpla el tratamiento según lo indicado, respetando la dosis, horarios de la toma y tiempo de tratamiento.
- No prolongue ni interrumpa el tratamiento salvo que se lo indique el profesional.
- No utilice antibióticos que le hayan sobrado o que les hayan sobrado a otros.
- Lávese frecuentemente las manos con agua y con jabón.
- Mantenga su calendario de vacunación al día.

Leflumar[®] se puede utilizar para tratar infecciones en:

- los senos paranasales;
- los pulmones, en personas con problemas respiratorios de larga duración o neumonía;
- el tracto urinario, incluyendo los riñones o la vejiga;
- la próstata, cuando la infección es persistente;
- la piel y bajo la piel, incluidos los músculos. Esto se denomina algunas veces "tejidos blandos".

En algunas situaciones especiales, Leflumar[®] se puede utilizar para reducir la posibilidad de adquirir una infección pulmonar denominada ántrax o un agravamiento de dicha enfermedad después de que haya estado expuesto a la bacteria causante del ántrax.

2. Antes de usar Leflumar[®] Ud. debe conocer

No debe personas no deberían utilizar Leflumar[®]?

Ud debe utilizar Leflumar[®] si:

- es alérgico a Levofloxacin o a otros antibióticos del tipo de las quinolonas o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento;
- padece o ha padecido epilepsia;
- ha sufrido alguna vez problemas en los tendones, como tendinitis, que estuvieran relacionados con la toma de medicamentos del tipo de las quinolonas. El tendón es el tejido que une su músculo con el esqueleto;
- es un niño o adolescente en periodo de crecimiento (menor de 18 años);
- está embarazada, pudiera quedarse embarazada o cree que podría estar embarazada;
- está en periodo de lactancia.

¿Qué cuidados debe tener antes de iniciar el tratamiento con Leflumar[®]?

Antes de utilizar Leflumar[®] su médico debe conocer si Ud.:

- ha desarrollado alguna vez una erupción cutánea grave o descamación de la piel, ampollas y/o llagas en la boca después de tomar Levofloxacin;
 - tiene 60 años o edad superior;
 - está usando corticosteroides, a veces llamados esteroides;
 - ha tenido alguna vez un ataque epiléptico (convulsiones);
 - ha sufrido daño cerebral debido a un accidente cerebrovascular u otra lesión cerebral;
 - tiene problemas de riñón;
 - tiene lo que se conoce como "deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa", ya que puede ser propenso a tener problemas en la sangre graves cuando esté tomando este medicamento;
 - ha tenido alguna vez problemas mentales;
 - alguna vez ha tenido problemas de corazón: se debe tener precaución cuando esté utilizando este tipo de medicamento, si ha nacido con, o tiene antecedentes familiares de prolongación del intervalo QT (visto en el electrocardiograma (ECG), representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón), tiene desequilibrio en los niveles de sales en sangre (especialmente un bajo nivel de potasio o magnesio en sangre), tiene un ritmo cardíaco lento (denominado "bradicardia"), tiene un corazón débil (fallo cardíaco), tiene antecedentes de ataque al corazón (infarto de miocardio), si es una mujer o una persona de edad avanzada o está tomando otros medicamentos que puedan producir cambios anormales en el ECG;
 - es diabético;
 - alguna vez ha tenido problemas de hígado;
 - padece miastenia gravis;
 - le han diagnosticado agrandamiento o "abultamiento" de un vaso sanguíneo grande (aneurisma aórtico) o aneurisma periférico de vasos grandes;
 - ha experimentado un episodio previo de disección aórtica (un desgarramiento en la pared de la aorta);
 - tiene antecedentes familiares de aneurisma aórtico o disección aórtica u otros factores de riesgo o condiciones predisponentes (por ejemplo, trastornos del tejido conectivo como el síndrome de Marfan, o el síndrome vascular de Ehlers-Danlos, o trastornos vasculares como la arteritis de Takayasu, la arteritis de células gigantes, la enfermedad de Behcet, presión arterial alta, o aterosclerosis conocida).
- No debe tomar medicamentos antibióticos que contengan quinolonas, incluyendo Leflumar[®], si ha experimentado alguna reacción adversa grave en el pasado al tomar una quinolona.
- En esta situación, debe informar a su médico tan pronto como sea posible.

Tenga cuidado especial con Leflumar[®]

Se han notificado reacciones cutáneas graves incluyendo síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica (NET), y reacción a fármaco con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS) con el uso de Levofloxacin.

- Si usted desarrolla una erupción grave o algún síntoma de la piel como ampollas, granos rojizos en forma de diana o

manchas circulares y/o úlceras, deje de tomar Levofloxacin y contacte a su médico o busque atención médica inmediatamente.

- Consulte inmediatamente a un oftalmólogo si experimenta alguna alteración en su visión o tiene cualquier problema en sus ojos.
- Si siente un dolor repentino e intenso en el abdomen, el tórax o la espalda, acuda inmediatamente a un servicio de emergencia.

El dolor y la hinchazón en las articulaciones y la inflamación o ruptura de los tendones pueden ocurrir raramente. Su riesgo aumenta si es una persona mayor de 60 años, ha recibido un trasplante de órgano, tiene problemas de riñón o si está siendo tratado con corticosteroides. La inflamación y la ruptura de los tendones pueden ocurrir dentro de las primeras 48 horas de tratamiento e incluso hasta varios meses después de interrumpir la terapia con Leflumar[®]. Al primer signo de dolor o inflamación de un tendón (por ejemplo, en su tobillo, muñeca, codo, hombro o rodilla), deje de tomar Leflumar[®] y comuníquese con su médico.

Rara vez puede experimentar síntomas de daño a los nervios (neuropatía) como dolor, ardor, hormigueo, entumecimiento y/o debilidad, especialmente en los pies y las piernas o las manos y los brazos. Si esto sucede, deje de tomar Leflumar[®] e informe a su médico inmediatamente.

Los antibióticos que contienen quinolonas, incluyendo Levofloxacin, han sido asociados con efectos secundarios muy raros pero graves, algunos de ellos de larga duración (continuando meses o años), incapacitantes o potencialmente irreversibles. Esto incluye el tendón, dolor en los músculos y articulaciones de las extremidades superiores e inferiores, dificultad para caminar, hormigueo, cosquilleo, entumecimiento o ardor (parestesia), trastornos sensoriales que incluyen deterioro de la visión, gusto y olfato y audición, depresión, deterioro de la memoria, fatiga severa y trastornos severos del sueño.

Si experimenta alguno de estos efectos secundarios después de tomar Leflumar[®], comuníquese con su médico inmediatamente antes de continuar el tratamiento.

Niños y adolescentes

La administración de Leflumar[®] no está recomendada en niños y adolescentes menores de 18 años.

Uso de Leflumar[®] con otros medicamentos

Informe a su médico acerca de los medicamentos que usted toma, incluyendo medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas o suplementos herbarios. Leflumar[®] y otros medicamentos pueden afectarse mutuamente. Informe a su médico, especialmente si usted toma:

- corticosteroides, a veces llamados esteroides, usados para la inflamación. Puede tener más probabilidades de sufrir inflamación y/o rotura de sus tendones;
- warfarina usada para hacer la sangre más líquida. Puede tener mayor probabilidad de sufrir una hemorragia. Su médico puede necesitar análisis de sangre periódicos para comprobar si su sangre coagula correctamente;
- teofilina usada para problemas respiratorios. Tiene mayor probabilidad de sufrir un ataque epiléptico (convulsiones);
- antiinflamatorios no esteroideos (AINES) usados para el dolor y la inflamación como el ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, fenbupreno, ketoprofeno, indometacina. Tiene mayor probabilidad de sufrir un ataque epiléptico (convulsiones) si los toma concomitantemente;
- ciclosporina usada después de los trasplantes de órganos. Puede tener mayor probabilidad de sufrir los efectos adversos de la ciclosporina.
- medicamentos de acción conocida sobre los latidos de su corazón. Esto incluye medicamentos usados para el ritmo anormal de corazón (antiarrítmicos como quinidina, hidroquinidina, disopiramida, sotalol, dofetilida, ibutilida y amiodarona), para la depresión (antidepresivos tricíclicos como amitriptilina e imipramina), para trastornos psiquiátricos (antipsicóticos), y para infecciones bacterianas (antibióticos "macrólidos" como eritromicina, azitromicina y claritromicina).
- probenecid (usado para la gota) y cimetidina (usada para úlceras y ardor de estómago). Se debe tener especial cuidado cuando se toman estos medicamentos concomitantemente con Levofloxacin. Si usted tiene problemas de riñón, su médico puede querer darle una dosis más baja.

No tome Leflumar[®] al mismo tiempo que los siguientes medicamentos, ya que pueden afectar al modo de acción de Leflumar[®]:

- comprimidos de hierro (para la anemia), suplementos de zinc, antiácidos que contengan aluminio o magnesio (para la acidez o ardor de estómago), didanosina, o sucralfato (para las úlceras de estómago).

Determinación de opiáceos en orina

Las pruebas de orina pueden mostrar resultados "falsos positivos" de presencia de analgésicos fuertes denominados "opiáceos" en pacientes que toman Levofloxacin. Informe a su médico que está tomando Levofloxacin si le ha recetado una prueba de orina.

Test de Tuberculosis

Este medicamento puede causar un resultado de "falso negativo" en algunos tests utilizados en el laboratorio para buscar la bacteria causante de la tuberculosis.

Si no está seguro si su medicamento es uno de los enumerados arriba, consulte a su médico o farmacéutico. Conozca los medicamentos que usted toma. Conserve una lista de ellos para mostrársela a su médico o farmacéutico cuando adquiera un nuevo medicamento.

Si ingresa en un hospital, informe a su médico que está tomando Leflumar[®].

Antes de utilizar este medicamento recuerde

Este medicamento requiere supervisión médica. Concurra a las visitas programadas con su médico y toda vez que presente algún acontecimiento adverso.

Conducción y uso de máquinas

Pueden aparecer algunos efectos adversos tales como mareos, somnolencia, alteración del equilibrio (vértigo) o alteraciones visuales. Algunos de estos efectos adversos pueden afectar a su capacidad para concentrarse o disminuir su velocidad de reacción. Si esto ocurre, no conduzca ni realice cualquier trabajo que requiera un nivel elevado de atención.

3. ¿Cómo utilizar Leflumar[®]?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Tome siempre Leflumar[®] tal y como le ha indicado su médico.

¿Cómo tomar Leflumar[®]

Leflumar[®] es de administración oral, con un vaso de agua, con o sin alimentos.

La dosis dependerá del tipo de infección que tenga y de dónde está localizada la infección en su cuerpo.

La dosis habitual recomendada para adultos es de 1 comprimido de Leflumar[®] 500 mg o Leflumar[®] 750 mg al día.

Proteja su piel de la luz solar

No exponga su piel directamente al sol (aún estando nublado) mientras esté tomando este medicamento y durante dos días después de dejar de tomarlo, ya que su piel se hará mucho más sensible al sol y puede quemarse o incluso llenarse de ampollas si no toma las siguientes precauciones:

- asegúrese de usar cremas solares con factor de protección alto;
- lleve siempre un sombrero y ropa que cubra sus brazos y piernas;
- evite las lámparas de rayos ultravioleta (UVA).

