



Paracetamol 500 mg Comprimidos

Industria Argentina
Venta Libre

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR GENIOL®,
conservar este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.**

¿Qué contiene Geniol®?

Cada comprimido de Geniol® contiene: principios activos: Paracetamol 500,0 mg, ingredientes inactivos: almidón de maíz pregelatinizado, croscarmelosa sódica, povidona, ácido esteárico.

Este medicamento es Libre de Gluten.



Acciones: calma el dolor. Baja la fiebre.

¿Para qué se utiliza Geniol®? Indicado para el alivio sintomático del dolor leve a moderado incluyendo dolor de cabeza, migraña previo diagnóstico médico, dolor de muelas, dolor de garganta, dolores menstruales, dolores musculares, alivio sintomático de los dolores reumáticos, estados gripales y/o resfriados, y para reducir la fiebre.

¿Cómo se utiliza este medicamento? Geniol® es de toma por vía oral y puede ser ingerido con agua. Como posología habitual se aconseja: **adultos, ancianos y niños mayores de 12 años de edad:** 1 comprimido cada 6 u 8 horas. Dosis máxima 4 g/día (8 comprimidos de 500 mg). **Niños menores de 12 años:** consulte con su médico. Si usted se olvidó de tomar Geniol®, puede tomarlo tan pronto como sea posible, pero recuerde esperar al menos 4 horas antes de la próxima toma. La duración del tratamiento no debe superar los cinco días consecutivos. Si el dolor persiste por más de 5 días o la fiebre más de 3 días o aparecen nuevos síntomas suspenda inmediatamente y consulte a su médico.

¿Qué personas no pueden utilizar Geniol®? NO USE este medicamento si usted: • es alérgico a alguno de los ingredientes, o si la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios le producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento? Consulte a su médico si usted: • tiene enfermedad del hígado (insuficiencia hepática); su médico podría necesitar reducirle la dosis. • es menor de 12 años, salvo indicación y prescripción del médico pediatra. • tiene enfermedad de los riñones (insuficiencia renal) moderada o severa; su médico podría necesitar reducirle la dosis. • está embarazada o está dándole el pecho a su bebé • tiene antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior, o consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica, consulte a su médico antes de tomarlo. • no debe excederse la dosis indicada. El Paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis. • no ingiera otro medicamento que contenga Paracetamol (como algunos antigripales) conjuntamente con este producto. • tiene que realizarse pruebas de laboratorio como análisis clínicos ya que Paracetamol puede alterarlas. • toma medicamentos para las convulsiones (fenitoína, fenobarbital), diuréticos, anticoagulantes (acenocumarol o warfarina), algunos antibióticos (rifampicina, isoniazida), medicamentos para el corazón (propranolol) o para alguna otra enfermedad crónica. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando este medicamento? Al igual que todos los medicamentos, Geniol® puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas lo sufran. Las personas con enfermedades del hígado y los riñones deben tener especial cuidado ya que Paracetamol puede afectar su funcionamiento y además afectar la acción de otros medicamentos. Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece: • dolor de cabeza • cambios en la orina (color o cantidad) • ganas de vomitar (náuseas) • mareos o inestabilidad • cansancio, sueño, nerviosismo • erupciones o picazón en la piel • piel amarillenta (ictericia) • dolor en la panza (dolor abdominal). Si usted presenta

cualquier efecto adverso no mencionado en el prospecto, suspenda el uso del medicamento inmediatamente y consulte a su médico. Si el dolor persiste por más de 5 días o empeora o si la fiebre persiste por más de 3 días o empeora consulte a su médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?

Si usted ha utilizado más Geniol® de lo indicado en este prospecto, consulte inmediatamente a su médico, aunque no presente síntomas.

Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.
- Hospital Dr. Alejandro Posadas. Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
- Hospital General de Agudos J. A. Fernández. Tel: (011) 4808-2655.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata. Tel.: (0221) 451-5555.

Presentación: 2 blister de 8 comprimidos c/u; 12 blister de 8 comprimidos c/u.

¿Dudas? ¿Consultas? 0800-333-3532 (ELEA) Anmat responde: 0800-333-1234

¿Cómo guardar este medicamento?

Modo de conservación: conservar entre 15 °C y 30 °C, en su envase original. Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento. MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 3764.

Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico. Laboratorio Elea Phoenix S.A.,

Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 0800-333-3532. www.elea.com

The logo for ELEA, featuring the word 'ELEA' in a bold, stylized, italicized font with a horizontal line through the middle of the letters.