

MYLANTA®

EXTRA

Famotidina - Hidróxido de Magnesio Carbonato de Calcio

Venta Libre
INDUSTRIA ARGENTINA

¿Qué contiene Mylanta® Extra?

Cada comprimido masticable contiene: Carbonato de Calcio 800 mg; Hidróxido de Magnesio 165 mg, Famotidina 10 mg. Exc.: manitol, sorbitol, polivinilpirrolidona, sabor menta, sucralosa, estearato de magnesio. Este medicamento es Libre de Gluten.

Acción:

Mylanta® Extra contiene un antagonista de los receptores de histamina H2 y dos antiácidos que neutralizan la acidez estomacal.

¿Para qué se usa Mylanta® Extra?

Está indicado para el alivio sintomático, a corto plazo, de los síntomas de ardor y de la acidez estomacal en adultos y adolescentes mayores de 16 años.

¿Qué personas no pueden recibir Mylanta® Extra?

NO USE este medicamento si usted: Es alérgico a alguno de los componentes del producto. Si padece alguna enfermedad en los riñones. Es menor de 16 años (en ese caso debe hacerlo con supervisión de su médico). Ante cualquier duda consulte con su médico o farmacéutico.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar Mylanta® Extra?

Consulte a su médico si Ud. tiene: Dificultad o dolor al tragar los alimentos. Vómitos reiterados o con sangre. Materia fecal con sangre o de color negro. Dolor en el pecho que se propaga a los brazos. Dificultad para respirar acompañada de la acidez. Pérdida de peso sin causa que la explique. Problemas en el hígado o en los riñones. Exceso de calcio en la sangre y/o bajos niveles de fósforo en la sangre. Exceso de calcio en la orina o antecedentes de cálculos en el riñón. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando Mylanta® Extra?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento; suspenda la medicación y consulte con su médico si aparecen alguno de los siguientes: palpitaciones, hematomas, cansancio, ansiedad, constipación, somnolencia, hinchazón del abdomen, sensación de plenitud, sequedad en la boca, dolores articulares y musculares, náuseas, vómitos, picazón y erupción en la piel. Suspenda su uso y consulte a su médico si la acidez empeora o no cede luego de dos semanas de utilizar Mylanta® Extra.

¿Cómo se usa Mylanta® Extra?

Mylanta® Extra es de administración oral. Adultos y adolescentes mayores de 16 años, masticar un comprimido una a dos veces por día. Mastique lentamente un comprimido entero de Mylanta® Extra una a dos veces por día. Puede masticar el comprimido durante el momento de dolor / ardor, antes de las comidas o

antes de acostarse y dormir. No debe tragar el comprimido entero. Siempre debe masticarlo. Mylanta® Extra puede ser administrado hasta dos veces por día (es decir 2 comprimidos masticables durante 24 horas). Mylanta® Extra no contiene azúcar ni sodio.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Ante una sobredosis accidental concurra al lugar más cercano de asistencia médica o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:

- Hosp. de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
- Hosp. A. Posadas: (011) 4654-6648/ (011) 4658-7777.
- Hosp. de Niños P. Elizalde (011) 4300-2115.
- Centro Nac. de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160.

Para otras consultas: Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix 0800-333-3532.

Presentaciones:

Envases conteniendo: 24 y 96 comprimidos (12 Blíster de 8 unidades).

Conservación:

Conservar entre 15°C y 30°C en su envase original. Verifique la fecha de vencimiento antes de tomar este o cualquier medicamento.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 51.322.

Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico.

Elaborado por Laboratorio Elea Phoenix S.A.,

Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines,

Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Bajo licencia exclusiva de Warner Lambert Co., U.S.A

