

MYLANTA[®]

FRESH

Carbonato de Calcio 500 mg

INDUSTRIA ARGENTINA
Venta Libre

¿Qué contiene MYLANTA[®] FRESH?

Cada comprimido masticable sabor menta contiene: Principio activo: Carbonato de Calcio 500 miligramos. Principios inactivos (excipientes): sorbitol; manitol; sucralosa; sabor menta; sabor durarome; goma arabiga; crospovidona; estearato de magnesio. Este medicamento es Libre de Gluten.

Acción:

Antiácido.

¿Para qué se usa MYLANTA[®] FRESH?

Para el alivio de los síntomas relacionados a la producción de ácido por el estómago (acidez gástrica).

¿Cómo se toma MYLANTA[®] FRESH?

MYLANTA[®] FRESH es solo de administración oral.

Adultos y niños mayores de 12 años: • Disuelva lentamente dentro de la boca uno a dos comprimidos masticables de MYLANTA[®] FRESH cuando sienta acidez o ardor estomacal. • Puede repetir la toma y consumir un comprimido masticable por hora si reaparecen los síntomas vinculados con la acidez. • No tomar más de 9 comprimidos masticables por día. • No exceda la dosis indicada. No tomar por un período mayor a 14 días. Si los síntomas persisten o empeoran consulte con su médico. Este medicamento reduce la acidez estomacal y debido a sus componentes otorga la sensación refrescante del aliento. Puede interferir con la absorción de otros medicamentos. Por este motivo, se recomienda espaciar el uso de MYLANTA[®] FRESH de la toma de otros medicamentos.

¿Qué personas no pueden tomar MYLANTA[®] FRESH?

NO USE este medicamento si:

- Es alérgico al carbonato de calcio o a cualquier componente de la fórmula.
- Está embarazada o amamantando.
- Niños.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar MYLANTA[®] FRESH?

Consulte a su médico si usted tiene:

- Dificultad o dolor al tragar los alimentos.
- Vómitos reiterados o con sangre.
- Materia fecal con sangre o de color negro.
- Dolor en el pecho que se propaga a los brazos.
- Dificultad para respirar acompañada de la acidez.
- Pérdida de peso sin causa que la explique.
- Problemas en los riñones.
- Exceso de calcio en la sangre y/o bajos niveles de fósforo en la sangre.
- Exceso de calcio en la orina o antecedentes de cálculos en el riñón.
- Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Interacciones con otros medicamentos:

Los antiácidos pueden interferir con la acción de otros medicamentos. Si usted está haciendo algún tratamiento consulte con su médico. No se aconseja utilizar este medicamento concomitantemente con antibióticos (medicamentos para tratar infecciones bacterianas) o con digoxina (medicamentos para tratar problemas del corazón). Los diuréticos del tipo de las tiazidas pueden provocar retención de calcio. Si se administran en forma conjunta pueden generar hipercalcemia (aumento del calcio en la sangre).

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando MYLANTA® FRESH?

Al igual que todos los medicamentos, MYLANTA® FRESH puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas lo sufran. El carbonato de calcio puede provocar constipación. Algunas personas pueden presentar eructos o cálculos en el riñón.

Si ocurriesen estos u otros efectos adversos, interrumpir el tratamiento y consultar con su médico o farmacéutico.

SI LOS SÍNTOMAS NO REMITEN O PERSISTEN MÁS DE 3 DÍAS (72 HORAS) CONSULTE CON SU MÉDICO.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

- Hospital de "Pediatria Ricardo Gutiérrez" Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.
- Hospital "A. Posadas" Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Tel. 0800-3330-160.

Para otras consultas:

Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix 0800-333-3532.

Presentación:

Envases conteniendo 18 comprimidos masticables.

¿Cómo guardar este medicamento?

Modo de conservación: Conservar a temperatura ambiente hasta 25 °C.

Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento.

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUAL QUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad medicinal autorizada por el M. S.

Cert. N°: 45.068.

Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos 2809,
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires.

Dir. Técnico: Alfredo Boccardo, Farmacéutico.

Bajo licencia exclusiva de Warner Lambert Co.; U.S.A.

Bajo Lic. W.L.
 PARKE-DAVIS

ELEA