# MYLANTA II®

Industria Argentina
Venta bajo receta

## *Hidróxido de Aluminio*
## *Hidróxido de Magnesio*
## *Simeticona*

## *Suspensión*
## *SABOR FRUTAL*

### Fórmula:
Cada 100 ml contiene: Hidróxido de Magnesio en pasta al 30% (equiv. a 8 g de Hidróxido de Magnesio) 26,650 g; Hidróxido de Aluminio gel desecado (equiv. a 8 g de Hidróxido de Aluminio) 44,650 g; Simeticona 30% 2,0 g (equiv. a 0,6 g). Exc.: butilparabeno; propilparabeno; ácido cítrico; sacarina sódica; solución de sorbitol; aroma de ananá; solución de hipoclorito de sodio; agua purificada.
**Este medicamento es Libre de Gluten.**

### Acción terapéutica:
Antiácido. Antiflatulento. Demulcente.

### Indicaciones:
Tratamiento sintomático de acidez gástrica, pirosis, dispepsia ácida y trastornos gastrointestinales asociados a exceso de gas.

### Posología y forma de administración:
**SE DESACONSEJA EL CONSUMO DIRECTO DESDE LA BOCA DEL ENVASE. UTILICE SIEMPRE UNA CUCHARA.**
La posología será establecida por el médico en función del proceso a tratar y las caracte- rísticas del paciente. Como orientación se recomienda de 2 a 4 cucharaditas de té (10-20 ml) entre las comidas y al acostarse.

### Precauciones y advertencias:
No tomar más de 20 cucharaditas de té (100 ml) en 24 horas, ni más de 60 ml/día durante más de dos semanas. Los antiácidos a base de aluminio y magnesio deben utili- zarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal. La ingesta prolongada de este tipo de fármacos en pacientes en diálisis pueden inducir o empeorar la osteomalacia por diálisis.
Niveles elevados de aluminio están asociados con el desarrollo de encefalopatía y osteomalacia por diálisis. El aluminio interfiere con la absorción de fosfatos en el tracto gastrointestinal. En consecuencia, el empleo prolongado de antiácidos a ba- se de aluminio puede resultar en hipofosfatemia si la ingesta de fosfatos no es la adecuada. La hipofosfatemia severa puede manifestarse por malestar general, anorexia, debilidad muscular y osteomalacia. Como cualquier otro fármaco, el empleo de **Mylanta II**®, durante el embarazo y la lactancia debe estar expresamente indicado por el médico tratante.

## Contraindicaciones:
Hipersensibilidad conocida a cualquiera de los integrantes de la fórmula.

## Reacciones adversas:
Ocasionalmente y con dosis elevadas se han reportado regurgitación y diarrea leve.

## Interacciones:
Los antiácidos a base de aluminio pueden disminuir la absorción gastrointestinal de hierro, digitálicos, fenitoína, fluoroquinolonas, isoniacida, ketoconazol y tetraciclinas, pudiendo ser necesarios ajustes posológicos. Se recomienda administrar este medicamento alejado 2-3 horas de la ingesta de cualquier otro.

## Información para el paciente:
la aci- dez y la sensación de malestar estoma- cal se deben a un exceso de ácido en el estómago o la presencia de ácido en el esófago. Este exceso puede ser produci- do por ciertas comidas (café, bebidas cola, grasas, frutas cítricas, tomates, ce- bolla, chocolates) y por situaciones de stress. El ardor percibido resulta de la acción de estos ácidos en exceso sobre la pared del estómago y del esófago.
**Mylanta II**® es una medicación de doble acción: antiácida y antigas. Además, su fórmula exclusiva suaviza y alivia la irritación de la mucosa estomacal.
Contiene Hidróxido de Magnesio e Hidróxido de Aluminio, principios activos que se combinan con el ácido clorhí- drico del estómago produciendo su neutralización. Ambos principios son insolubles y no se absorben, por lo que el organismo los evacúa totalmente. También contiene Simeticona que provoca la ruptura de burbujas forma- das por aire que se encuentran en el estómago y el intestino. De este modo, el gas puede ser eliminado fácilmente, evitando así distensión y sensación de malestar. La Simeticona es un elemen- to inerte, derivado del silicio, que tam- poco es absorbida por el organismo.
La potencia antiácida se mide por la capacidad de neutralización de ácido o capacidad para absorber iones H+. Esta potencia se expresa en miliequi- valente (mEq), a mayor es esta capa- cidad neutralizante, mayor es la potencia de un antiácido.
La potencia antiácida de 10 ml o de 2 comprimidos masticables de **Mylanta II**® es de 50.8 mEq.
**Ante cualquier duda consulte a su médico.**

## Sobredosis:
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Htal. más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
*Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:* (011) 4962-6666/2247.
*Hospital A. Posadas:* (011) 4654-6648/4658-7777.
*Centro Nacional de Intoxicaciones:* 0800-333-0160.
Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix **0800-333-3532**.

## Presentaciones:
Sabor Frutal: Envases conteniendo 160 y 360 ml.

**Almacenar por debajo de 40°C, preferentemente entre 15°C - 30°C, en envase bien cerrado.**
**NO COLOCAR EN LA HELADERA NI CONGELAR.**

**AGITAR BIEN ANTES DE USAR.**
MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 42.168. Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica.
Elaborado por Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos Nº 2809,
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina; bajo licencia exclusiva de
Warner Lambert Co., U.S.A.

Bajo Licencia W.L. PARKE-DAVIS

Elea