

Rapilax®

Picosulfato de Sodio



SOLUCIÓN GOTAS

Uso oral

INDUSTRIA ARGENTINA

Venta bajo receta

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.

Fórmula:

Cada 100 ml contiene: Picosulfato e Sodio 750 mg. Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, sorbitol 70%, agua purificada. Este medicamento es Libre de Gluten.

Acción Terapéutica:

Laxante.

Indicaciones:

Tratamiento sintomático de la constipación ocasional.

Características Farmacológicas:

Acción farmacológica: el Picosulfato de Sodio es un laxante estimulante, modifica el intercambio hidroelectrónico intestinal y estimula la motilidad.

Farmacocinética:

El Picosulfato de Sodio es metabolizado por las bacterias intestinales dando el compuesto activo. Se elimina principalmente por heces, y cerca del 18% conjugado con glucurónico por orina.

Posología y forma de administración:

20 gotas de Rapilax® Gotas equivalen a 1 ml y contienen 7.5 mg de Picosulfato de Sodio. Rapilax® Gotas puede ingerirse preferentemente por las noches con escaso líquido (agua, gaseosa, leche, etc.) pues carece de sabor y color.

Adultos y niños mayores de 12 años: 13 a 26 gotas por día (5.0 a 10.0 mg por día).

Niños de 4 a 12 años: 6 a 13 gotas por día (2.5 a 5.0 mg por día).

Contraindicaciones:

Colopatías orgánicas inflamatorias (rectocolitis ulcerosa, enfermedad de Chron), síndrome oclusivo o suboclusivo, síndrome abdominal no diagnosticado.

Niños menores de 4 años: hipersensibilidad al principio activo o a cualquier componente del medicamento.

Precauciones y advertencias:

No ingerir en dosis mayores a las recomendadas, o con mayor frecuencia de lo recomendado especialmente en pacientes bajo tratamiento con diuréticos, digitálicos o esteroides.

El tratamiento con medicamento de la constipación es una medida adyuvante del tratamiento higiénico dietético (por ejemplo, aumento de fibras en la dieta y ejercicio físico). Tomar en forma prolongada laxantes (más de 8 a 10 días), puede traer aparejados los siguientes problemas: colopatía funcional severa, melanosis rectocólica, anomalías hidroelectrolíticas con hipocalcemia; siendo esta última muy poco frecuente, y una situación de dependencia de los laxantes con necesidad de aumentar la dosis y producción de constipación severa en caso de que no se consuman laxantes.

Embarazo y lactancia:

No se recomienda el uso durante estos períodos. Rapilax® Gotas está contraindicado durante el primer trimestre de embarazo.

Interacciones medicamentosas:

El uso de Picosulfato de Sodio puede provocar pérdidas importantes de electrolitos por el tracto gastrointestinal, con el riesgo de hipokalemia. Por lo tanto se recomienda debida precaución en caso de necesitar coadministrar drogas tales como: amiodarona, quinidina, digitálicos, astemizol, terfenadina, anfotericina B, corticoides y eritromicina, o cualquier agente que produzca hipokalemia (por ejemplo diuréticos no ahorradores de potasio.)

Reacciones adversas:

En casos raros pueden presentarse dolores abdominales.

El uso prolongado puede provocar diarrea con pérdida de agua y electrolitos, particularmente de potasio.

Sobredosificación:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247.

Hospital A. Posadas. Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

Para otras consultas: Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix 0800-333-3532.

Presentación:

Rapilax® Gotas: envase con frasco gotero de 50 ml.

Conservación y almacenamiento:

conservar a temperatura ambiente (entre 10°C a 30°C), en lugar seco y en su envase original.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 33.309.

Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica.

Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines,

Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

¿Dudas, Consultas? 0800-333-3532 | elea.com

Fecha de última revisión: Diciembre/2000

506839-01 3-ep-i

