

Bronquisedan®

MAX



Venta Libre
INDUSTRIA ARGENTINA

Bromhexina HCL 10 mg/5 ml Elixir Vía Oral

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Acción terapéutica: expectorante y mucolítico de las secreciones bronquiales.

¿Para qué se usa Bronquisedan® Max?

Alivio de los síntomas del catarro bronquial y la tos. Por fluidificación del moco facilitando la expectoración.

¿Cómo se usa este medicamento?

Dosis: adultos y niños mayores de 12 años: 5 ml (1 cucharada de té) tres veces por día. No contiene azúcar y es apto para ser administrado a diabéticos. Por su contenido de alcohol **no se aconseja para menores de 12 años.**

Modo de uso: vía de administración oral.

¿Qué contiene Bronquisedan® Max?

Cada 100 ml contiene: Bromhexina Clorhidrato 200 mg. Excipientes: metilparabeno; propilparabeno; aceite de castor hidrogenado; carbomero; glicerina; alcohol etílico; mentol; sucralosa sorbitol 70%; hidróxido de sodio; esencia de miel; colorante caramelo; agua purificada c.s.p. 100 ml.

¿Qué personas no pueden recibir Bronquisedan® Max?

No use este medicamento si usted sabe que:

- es alérgico al principio activo o componentes activos de la fórmula.
- tiene úlcera gastroduodenal.
- tiene dificultad para expectorar.
- tiene asma.
- tiene enfermedades de hígado o riñón o toma alcohol.
- menores de 12 años.
- pacientes en tratamiento con Disulfiram.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Consulte con su médico antes de ingerir este medicamento en los siguientes casos:

- si está tomando simultáneamente algún medicamento, por ejemplo otros medicamentos para la tos.
- si va a ser utilizado en personas mayores de 65 años.
- dado que durante este tratamiento es de esperar un aumento de la secreción, puede no ser aconsejable en paciente con dificultades para expectorar.

Si usted recibe algún medicamento, está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de tomar éste medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Reacciones alérgicas como shock anafiláctico, angioedema (hinchazón rápida de la piel, de los tejidos subcutáneos, de las mucosas o de los tejidos sub-mucosos) y picazón. Reacciones adversas cutáneas intensas (tales como eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica). Se han recibido informes de reacciones cutáneas intensas tales asociadas a la administración de Bromhexina. Si le aparece una erupción cutánea (incluidas lesiones de las mucosas de, por ejemplo, la boca, la garganta, la nariz, los ojos y los genitales), deje de usar Bromhexina y consulte a su médico inmediatamente. Pueden aparecer efectos no deseados causados por éste medicamento, como gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal), respiratorios (reacciones alérgicas severas, dificultad para respirar, etc) y de la piel (picazón, ronchas).

Bronquisedan®

MAX



SIN
AZÚCAR

Venta Libre
INDUSTRIA ARGENTINA

Bromhexina HCL 10 mg/5 ml
Elixir Vía Oral

Si esto sucede, suspender el tratamiento y consultar al médico. **Si los síntomas del catarro bronquial persisten por más de 2 días, o empeoran consulte inmediatamente con su médico. No administrar este producto por más de 5 días.**

Modo de conservación y almacenamiento:

Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C bien cerrado y al abrigo de la luz.

MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL, NO DEBE UTILIZARSE DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE. MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Presentación:

Envase con 150 ml

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una posible sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247. Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777. Hospital Fernández: (011) 4808-2655 / 4801-7767. Optativamente otros Centros de Intoxicaciones.

¿Dudas? ¿Consultas? 0800-333-3532 ANMAT Responde 0800-333-1234

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 40.850. Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica. Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 0800-333-3532 | elea.com. Fecha de la última revisión: Abril/2018

 Elea