

GENIOL® FORTE

Paracetamol 650 mg Comprimidos

Industria Argentina
Venta Libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR GENIOL® FORTE,

Conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene Geniol® Forte? Cada comprimido de Geniol® Forte contiene: principios activos: Paracetamol 650,0 mg, ingredientes inactivos: almidón de maíz pregelatinizado, croscarmelosa sódica, povidona, ácido esteárico.

Este medicamento es Libre de Gluten.



Acciones: analgésico. Antifebril.

¿Para qué se utiliza Geniol® Forte? Geniol® Forte se usa para el alivio sintomático de dolores de cabeza, menstruales, musculares, articulares, dentales leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfríos y para reducir la fiebre.

¿Cómo se utiliza Geniol® Forte? Geniol® Forte es de toma por vía oral y puede ser ingerido con agua. Como posología habitual se aconseja: **adultos y niños mayores de 12 años:** 1 comprimido cada 6 u 8 horas. Dosis máxima: 4 g/día (5 comprimidos de 650 mg).

Niños menores de 12 años: consulte con su médico o farmacéutico. Si usted se olvidó de tomar Geniol® Forte, puede tomarlo tan pronto como sea posible, pero recuerde esperar al menos 4 horas antes de la próxima toma. La duración del tratamiento no debe superar los cinco días consecutivos. Si el dolor persiste por más de 5 días o la fiebre más de 3 días o aparecen nuevos síntomas suspenda inmediatamente y consulte a su médico.

¿Qué personas no pueden utilizar Geniol® Forte? NO USE este medicamento si usted: • es alérgico al principio activo Paracetamol o a alguno de los principios inactivos del comprimido. • es alérgico a la aspirina o a otros analgésicos antiinflamatorios.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar Geniol® Forte? Consulte a su médico si usted: • tiene enfermedad del hígado (insuficiencia hepática); su médico podría necesitar reducirle la dosis. • es menor de 12 años, salvo indicación y prescripción del médico pediatra. • está tomando otros medicamentos que contienen Paracetamol, como antigripales (de prescripción o no). Si no está seguro consulte a su médico o farmacéutico. • tiene enfermedad de los riñones (insuficiencia renal) moderada o severa; su médico podría necesitar reducirle la dosis. • tiene enfermedades del estómago como úlcera o gastritis. • tiene alcoholismo o toma 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica. • está embarazada o está dándole el pecho a su bebé. • tiene que realizarse pruebas de laboratorio como análisis clínicos ya que Paracetamol puede alterarlas. • toma medicamentos para las convulsiones (fenitoína, fenobarbital), diuréticos, anticoagulantes (acenocumarol o warfarina), algunos antibióticos (rifampicina, isoniazida), medicamentos para el corazón (propranolol) o para alguna otra enfermedad crónica. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte con su médico antes de utilizar este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando Geniol® Forte? Al igual que todos los medicamentos, Geniol® Forte puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas lo sufran. Las personas con enfermedades del hígado y los riñones deben tener especial cuidado ya que Paracetamol puede afectar su funcionamiento y además afectar la acción de otros

medicamentos. Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece: • dolor de cabeza • cambios en la orina (color o cantidad) • ganas de vomitar (náuseas) • mareos o inestabilidad • cansancio, sueño, nerviosismo • erupciones o picazón en la piel • piel amarillenta (ictericia) • dolor en la panza (dolor abdominal). Si usted presenta cualquier efecto adverso no mencionado en el prospecto, suspenda el uso del medicamento inmediatamente y consulte a su médico. Si el dolor persiste por más de 5 días o la fiebre más de 3 días o aparecen nuevos síntomas, suspenda inmediatamente y consulte a su médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?

Si usted ha utilizado más Geniol® Forte de lo indicado en este prospecto, consulte inmediatamente a su médico, aunque no presente síntomas. Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.
- Hospital Dr. Alejandro Posadas. Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
- Hospital General de Agudos J. A. Fernández. Tel: (011) 4808-2655.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata. Tel.: (0221) 451-5555.

Presentación: 2 blister de 8 comprimidos c/u; 12 blister de 8 comprimidos c/u.

¿Dudas? ¿Consultas? 0800-333-3532 (ELEA) Anmat responde: 0800-333-1234

¿Cómo guardar este medicamento? Modo de conservación: conservar a temperatura ambiente hasta 25 °C. Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento. MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO