

Hepatalgina®

Venta Libre

Alcachofa, Daucus Carota, Ácido Dehidrocólico
Ácido Desoxicólico, Boldina, Mentol

Comprimidos recubiertos

Lea cuidadosamente esta información antes de tomar Hepatalgina®.

¿Qué contiene Hepatalgina®?

Cada comprimido recubierto contiene: Extracto seco de Alcachofa (Cynara scolymus) 200 mg, Boldina 2 mg, Extracto seco de Daucus Carota 100 mg, Ácido Dehidrocólico 20 mg, Ácido Desoxicólico 10 mg, Mentol 1 mg. Excipientes: povidona, almidón de maíz, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, lactosa monohidrato, talco, dióxido de titanio, allura red AC laca aluminica, hidroxipropilmetilcelulosa, polietilenglicol 4000, sacarina sódica. **Este medicamento es Libre de Gluten. Contiene lactosa.**

¿Qué efecto tiene Hepatalgina®?

Hepatalgina® es una combinación de sustancias: su principal componente activo es de origen natural (vegetal), extraído de las hojas de Cynara scolymus (Alcachofa o alcaucil) tradicionalmente utilizado como protector del hígado, es digestivo, aumenta la cantidad de bilis (colerético) y facilita su pasaje al tubo digestivo (colagogo) y se ha complementado su fórmula con extractos que ayudan al proceso digestivo. Es un producto que estimula la función del hígado y de la vesícula biliar.

¿Para qué se usa Hepatalgina®?

Para los trastornos del hígado y de la vesícula biliar con manifestaciones de pesadez estomacal.

¿Cómo se usa Hepatalgina®?

Adultos y niños mayores de 6 años: tomar 1 a 2 comprimidos recubiertos dos a cuatro veces por día con un vaso de agua. Preferentemente después de las comidas.

¿Qué personas no pueden recibir este medicamento?

- Niños menores de 6 años.
- No utilizar en caso de obstrucción completa de las vías biliares principales o enfermedad grave del hígado.

¿Qué reacción adversa puede provocarme la toma de este medicamento?

- En algunos pacientes puede provocar deposiciones blandas o frecuentes.

¿Qué cuidados debo tener antes de usar este medicamento?

Consulte a su médico en los siguientes casos: • si Ud. está tomando otro medicamento, está embarazada o dando de mamar. • si conoce o sospecha que padece de trastornos en hígado y/o riñón. • si recuerda haber tenido una reacción alérgica a alguno de los componentes del medicamento.

Este medicamento contiene Lactosa. Los pacientes con problemas hereditarios poco frecuentes de intolerancia a la galactosa, deficiencia de Lapp Lactasa o mala absorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento.

Hepatalgina®

Venta Libre

Alcachofa, Daucus Carota, Ácido Dehidrocólico
Ácido Desoxicólico, Boldina, Mentol

Comprimidos recubiertos

¿Qué cuidados debo tener mientras tomo Hepatalgina®?

• En caso de tomar este medicamento para aliviar molestias digestivas y si las mismas persisten o empeoran, consulte al médico inmediatamente, especialmente si se trata de dolor. No espere más de 5 días sin consultar al médico. **ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

Sobredosificación: ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología: - Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247. - Hospital Dr. A. Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777. - Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160. Para otras consultas: Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix **0800-333-3532**.

Presentaciones: envases conteniendo 10, 20 y 40 comprimidos recubiertos.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Conservación: conservar entre 0°C y 30°C en lugar seco.

E.M.A.M.S. Certificado N° 2.924. DT: Farm. Laura A. B. Hernández. Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Centro de Atención telefónica: **0800-333-3532** | elea.com

"El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial impreso en sistema Braille para facilitar su identificación por los pacientes no videntes".

Fecha de última revisión: Mayo/2014



Elea