

CEDRIMUC®

Despega y expulsa la flema adherida en bronquios

Mucolítico

Granulado efervescente



Acetilcisteína 200 mg

CONT.: 10 sobres monodosis de polvo granulado

Venta libre. INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR Cedrimuc®

¿Qué contiene Cedrimuc®?

Cada sobre monodosis de polvo granulado contiene:

Principio activo: Acetilcisteína 200 mg.

Excipientes: carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, ácido cítrico anhidro, dióxido de silicio coloidal, sucralosa, sabor naranja en polvo, colorante FD&C amarillo N° 6.

Este medicamento es Libre de Gluten.



ACCIÓN: Cedrimuc® pertenece a un grupo de medicamentos llamados mucolíticos, es decir que rompe químicamente el moco haciéndolo más líquido para que pueda ser eliminado.

¿Para qué se usa Cedrimuc®?

Cedrimuc® fluidifica el moco adherido, despegándolo y facilitando su expulsión. Este medicamento se utiliza en los procesos catarrales y gripales para reducir la viscosidad de los mocos y flemas, facilitando su expulsión.

¿Qué personas no pueden utilizar Cedrimuc®?:

NO USE este medicamento: si es alérgico a Acetilcisteína o a cualquiera de sus componentes; si padece úlcera aguda de estómago o duodeno; en menores de 12 años; si está embarazada o dándole el pecho a su bebé.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar Cedrimuc®? Consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento con Cedrimuc® si usted: toma medicamentos para la tos (antitusivos) o que disminuyen las secreciones bronquiales (como los antihistamínicos y los anticolinérgicos), ya que pueden provocar una acumulación del moco fluidificado; padece problemas respiratorios crónicos como asma o problemas respiratorios de gravedad; toma algún medicamento que contenga minerales como el hierro o calcio, o algún medicamento con antibióticos (como la ampicilina, los macrólidos, las cefalosporinas y la anfotericina B).

En estos casos, debe separar la toma de los mismos de la toma de Cedrimuc® al menos 2 horas. Es posible que encuentre un olor intenso (olor azufrado) que es propio del principio activo del medicamento. No indica que Cedrimuc® esté en malas condiciones. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dándole el pecho a su bebé, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

¿Cómo se usa este medicamento?

Cedrimuc® es de administración oral.

Modo de uso: colocar todo el contenido de un sobre en medio vaso de agua. Revuelva hasta que se disuelva por completo el granulado. Administrar luego de las comidas. La dosis usual es: adultos y niños mayores de 12 años: 1 sobre monodosis de 200 mg tres veces por día. No superar la dosis de 3 sobres al día. La duración del tratamiento es en general entre 5 a 7 días. Si usted olvidó tomar Cedrimuc® no tome luego una dosis doble para compensar las olvidadas. El consumo de alimentos y bebidas no afecta su eficacia. Cedrimuc® se puede tomar con o sin comida.

CEDRIMUC®

**Despega y expulsa la flema
adherida en bronquios**
Mucolítico

Granulado efervescente



¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Como todos los medicamentos, la Acetilcisteína puede tener efectos adversos. Ocasionalmente pueden aparecer molestias digestivas como ardor estomacal, náuseas, vómitos, diarrea. Raramente pueden observarse somnolencia, dolor de cabeza, erupción cutánea y fiebre. Acetilcisteína puede producir somnolencia. Si le produce somnolencia, no conduzca ni use maquinaria peligrosa. Si usted observa éstos o cualquier otro efecto no descrito en este prospecto, consulte a su médico. Si usted observa que los síntomas empeoran o si persisten después de 5 días de tratamiento, consulte a su médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria? Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones: Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247. Hospital Dr. A. Posadas. Tel.: (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777. Centro Nacional de Intoxicaciones. Tel.: 0800-333-0160.

Para otras consultas: Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix 0800-333-3532.

¿Dudas? ¿Consultas?

0800-333-3532 (ELEA PHOENIX)

ANMAT responde: 0800-333-1234

¿Cómo se debe guardar este medicamento?

Modo de conservación: conservar a temperatura ambiente, hasta 25°C.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento.

PRESENTACIÓN

1 sobre monodosis. Envase conteniendo 10 sobres monodosis.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 59.104. Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica.

Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Para mayor información comunicarse con el **Centro de Atención telefónica 0800-333-3532 | elea.com**

Fecha de última revisión: Noviembre/2019