

# Lisovyr® Aciclovir



## Ungüento

Venta bajo receta  
INDUSTRIA ARGENTINA

### FÓRMULA

Cada 100 g de ungüento contiene: Aciclovir 5 g.

Excipientes: clorobutanol; base para ungüentos.

**Este medicamento es Libre de Gluten.**

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antivírico. Antihérpético, activo contra los virus humanos herpes simplex (Tipo 1 y 2) y varicela-zóster.

### INDICACIONES

Tratamiento de la infección mucocutánea inicial o recurrente producida por virus herpes simplex, no obstante el Aciclovir sistémico es más efectivo. Tratamiento coadyuvante de las infecciones por herpes zóster en pacientes inmunocomprometidos que hayan comenzado el tratamiento por vía sistémica con otros regímenes de tratamiento para herpes zóster.

### POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

El tratamiento deberá iniciarse tan pronto como sea posible ante la aparición de los primeros signos/síntomas de infección herpética. La posología será establecida por el médico en función del proceso a tratar y las características del paciente.

**Como orientación, en adultos y niños, se sugiere el siguiente esquema posológico:** aplicar sobre la zona afectada cada tres horas, 6 veces al día, durante 7 días. La cantidad deberá ser la suficiente para cubrir adecuadamente todas las lesiones.

**No aplicar sobre los ojos.**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Este medicamento es para uso cutáneo exclusivo, no puede aplicarse sobre los ojos.

Ha sido reportada resistencia al Aciclovir en el tratamiento prolongado de pacientes inmunocomprometidos.

El uso de antivirales por vía tópica puede conducir a la sensibilización cutánea, resultando en reacciones de hipersensibilidad con el subsecuente uso tópico o sistémico de esta medicación.

No todos los pacientes con infección herpética requieren tratamiento con formas tópicas de Aciclovir.

**Embarazo:** debido a que no existen estudios controlados, como con cualquier otro fármaco, no se recomienda el empleo de Aciclovir durante el embarazo, a menos que los beneficios para la madre superen los potenciales riesgos para el feto.

**Lactancia:** se desconoce si el Aciclovir usado en forma tópica se excreta por leche materna, por lo que se recomienda precaución cuando este fármaco se utilice en mujeres que se encuentren amamantando.

### REACCIONES ADVERSAS

Lisovyr® ungüento es generalmente muy bien tolerado, excepcionalmente y en pacientes sensibles se han reportado los siguientes secundarismos:

**Incidencia más frecuente (28% aproximadamente):** dolor local moderado, edema, ardor y/o pinchazos en el sitio de aplicación.

**Incidencia menos frecuente (4% aproximadamente):** prurito.

**Incidencia rara (0,3% aproximadamente):** rash cutáneo.

Los mismos son generalmente de carácter leve y transitorio y ceden con el ajuste posológico o la suspensión del tratamiento.

### CONTRAINDICACIONES

La relación beneficio/riesgo deberá ser cuidadosamente

**evaluada en las siguientes condiciones:** antecedentes de hipersensibilidad al Aciclovir o a cualquiera de los integrantes de la fórmula. Embarazo. Lactancia.

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

- No aplique este medicamento en los ojos.
- Respete la forma y tiempo de tratamiento indicadas por su médico.
- Comunique a su médico si se encuentra embarazada o está amamantando.
- Recuerde que un medicamento beneficioso para usted puede ser perjudicial para otra persona.
- Comunique a su médico si está tomando otra medicación, sea ésta recetada por un profesional o de venta libre.
- No olvide comunicar a su médico si padece alguna enfermedad concomitante o si ha presentado, en alguna oportunidad alergia a éste u otro medicamento.
- No suspenda bruscamente ninguna medicación a menos que sea indicado por su médico.
- En caso de intoxicación consulte inmediatamente a su médico o a un centro asistencial.
- Consulte a su médico ante la aparición de cualquiera de los siguientes síntomas: dolor, picazón, ardor y/o enrojecimiento en la zona donde se aplica este medicamento.
- No consuma ni se aplique ningún medicamento fuera de su fecha de vencimiento.
- Guarde los medicamentos dentro de su envase original conservando los prospectos.

### MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

#### Sobredosificación:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría R. Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666/2247.

Hospital A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160.

Para otras consultas:

Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix  
0800-333-3532.

#### Presentación:

Envase conteniendo 10 g de ungüento.

Conservar entre 15°C y 25°C.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 29.605.

Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica.

Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 0800-333-3532 | elea.com

*"El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial impreso en sistema Braille para facilitar su identificación por los pacientes no videntes."*

Fecha de última revisión: Octubre/1995

