

FALGOS[®]



DOLOR DE **CABEZA** Y **ESTÓMAGO**

CONT.: **12** Comprimidos

INDUSTRIA ARGENTINA
VENTA LIBRE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.

○ ¿Qué contiene Falgos[®]?

Cada comprimido contiene: Aspirina 227 mg; Paracetamol (como Paracetamol 90%, 215,6 mg) 194 mg; Cafeína 33 mg; Hidróxido de Aluminio 25 mg; Hidróxido de Magnesio 50 mg. Excipientes: estearato de magnesio; almidón de maíz pregelatinizado; croscarmelosa sódica; lactosa monohidrato; celulosa microcristalina (PH 101); celulosa microcristalina (PH 102); talco; ácido esteárico; dióxido de silicio coloidal; colorante amarillo DYC N° 10 laca (Color 6010); colorante red FDYC N° 40 laca; colorante azul brillante FDYC laca. Este medicamento contiene Lactosa.

○ Acciones: Analgésico - Antiácido

○ ¿Para qué se usa Falgos[®]?

Falgos[®] comprimidos está indicado para **aliviar los síntomas del dolor de cabeza y la acidez estomacal** provocados por desórdenes en la ingesta.

○ ¿Qué personas no pueden tomar Falgos[®]?

- No usar este medicamento en caso de alergia conocida a la aspirina o a otros salicilatos, Paracetamol o cualquier otro componente de la formulación; en presencia de trastornos hemorrágicos; en presencia de úlceras gástricas o duodenales, enfermedad de hígado o riñones.
- En caso de que aparezcan molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, vértigo, consultar con el médico.
- Si padece asma, diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota, hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea, consulte a su médico.

○ **¿Qué cuidados debo tener antes de tomar Falgos®?**


- No administrar en menores de 15 años con síntomas de gripe o varicela, ya que puede incrementar el riesgo de desarrollar síndrome de reyé que es una enfermedad grave y potencialmente mortal. La ingestión de aspirina se ha relacionado con él, cuando se administra a los niños con cuadros febriles virales como la varicela o gripe.
- Las personas mayores de 65 años no deben tomar este medicamento sin consultar al médico ya que son más propensas a padecer efectos adversos.
- Si usted toma otros medicamentos como anticoagulantes, medicación para la diabetes, para el corazón, medicamentos para convulsiones u otros antiinflamatorios consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
- La ingesta de paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.
- Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica, consulte con su médico antes de tomar este medicamento.
- En caso de que aparezcan molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, vértigo, consultar con el médico.
- No ingiera otro medicamento que contenga paracetamol conjuntamente con este producto. Si usted está tomando algún medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento. Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o amamantando consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

○ **¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando Falgos®?**

- Si usted toma anticoagulantes, antidiabéticos, antianginosos, antiarrítmicos, anticonvulsivantes u otro antiinflamatorio consulte a su médico antes de ingerir este producto. Si usted está tomando algún medicamento, consulte a su médico antes de tomar este medicamento a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.
- Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como erupciones cutáneas (urticaria, picazón), alteraciones sanguíneas, náuseas, vómitos, malestar gástrico, irritación gástrica con o sin pérdida de sangre por materia fecal.
- Por la Aspirina: este medicamento debe ser administrado bajo estricta supervisión médica en pacientes con deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa debido al riesgo de hemólisis.
- También puede padecer hemorragia intracraneal que puede ser fatal, especialmente en los ancianos y trastornos hepato biliares: hepatitis crónica. Este medicamento puede producir taquicardia (aumento del número de latidos del corazón) nerviosismo, insomnio, temblor, etc., por el contenido de Cafeína.

○ **¿Cómo se usa Falgos®?**

- Adultos: 1 comprimido cada 6 horas. No utilizar por más de 2 días. Dosis máxima: 4 comprimidos por día. No exceder dosis indicada.



○ ¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria?:

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: Tel.: **0800-444 -8694/(011) 4962-6666/2247**

Hospital A. Posadas: Tel.: **(011) 4654-6648/4658-7777**

Hospital Fernández: Tel.: **(011) 4808-2655/4801-7767**

Optativamente **otros centros de intoxicaciones.**

Para otras consultas: **Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix 0800-333-3532.**

○ Modo de conservación y almacenamiento:

Conservar a temperatura ambiente, por debajo de 25°C. Mantener en su envase original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No usar si la lámina que protege a los comprimidos no está intacta.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.