

Caladryl[®] Incoloro

Difenhidramina HCl Óxido de Zinc

Venta libre - INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR CALADRYL[®] INCOLORO.
Ante cualquier duda, consulte con su médico y/o farmacéutico.

¿Qué contiene CALADRYL[®] INCOLORO?

Cada 100 gramos contiene: Principios activos: Difenhidramina Clorhidrato 1,000 g y Óxido de Zinc 2,000 g. Ingredientes inactivos: alcohol, hidroxipropilmetilcelulosa 400 cps, hidroxipropilmetilcelulosa 100 cps, glicerina, clorofilina sódica, perfume 1156 Fritzche, propilparabeno, metilparabeno, alcanfor, diazolidinil urea, polisorbato 40, propilenglicol, agua purificada.

Acción:

Antihistamínico, antialérgico, antipruriginoso.



¿Para qué se utiliza CALADRYL[®] INCOLORO?

CALADRYL[®] INCOLORO brinda alivio eficaz de la picazón y el dolor provocados por picaduras de insectos, quemaduras de sol, alergia a plantas, erupciones e irritaciones de la piel del tipo alérgicas.

CALADRYL[®] INCOLORO no contiene colorantes y no mancha la ropa.

¿Cómo se utiliza CALADRYL[®] INCOLORO?

Uso externo. Aplicar sobre el área de piel afectada no más de 3 a 4 veces por día. Antes de aplicar, lavar la piel con agua y jabón y secar. Para adultos y niños mayores de 2 años. Menores de 2 años, consultar con el médico. Si los síntomas persisten o empeoran luego de los 7 días, consulte con el médico.

¿Qué personas no pueden utilizar CALADRYL[®] INCOLORO?:

NO USE este medicamento:

- Si es alérgico a algunos de sus componentes.
- Si está embarazada o amamantando.
- Simultáneamente con otros productos que contengan difenhidramina, incluso si es de uso oral.
- Si presenta lesiones en áreas extensas de la piel.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar CALADRYL[®] INCOLORO?

Consulte a su médico antes de utilizar CALADRYL[®] INCOLORO si Ud.:

- Tiene varicela o sarampión.
- La piel tiene ampollas o alguna lastimadura que supura.

Si usted está embarazada o sospecha estarlo.

Caladryl[®] Incoloro

¿Qué cuidados debo tener mientras utilizo CALADRYL[®] INCOLORO?

Evite el contacto con los ojos o mucosas. Suspenda el uso si tiene ardor, aparece sarpullido o persisten los síntomas. Remueva con agua y jabón. SOLO USO EXTERNO.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si se aplicó más cantidad de la necesaria o ingesta accidental?

Busque asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones inmediatamente:

• Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247. • Hospital Dr. A. Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/(011) 4658-7777. • Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160.

¿Dudas? ¿Consultas?

0800-333-3532 (ELEA). Anmat responde: 0800-333-1234.

Presentación:

Envase con 100 mililitros.

¿Cómo guardar este medicamento?

Conservar entre 15°C y 30°C con el envase perfectamente cerrado. Proteger de la luz y del congelamiento. Verifique la fecha de vencimiento antes de utilizar este o cualquier medicamento. MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. Venta libre - INDUSTRIA ARGENTINA.

Bajo Lic. W.L.



Elaborado por Laboratorio Elea Phoenix S.A.,
Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Bajo Lic. exclusiva de Warner Lambert Co., USA.

E.M.A.M.S. Certificado N° 44.190. DT: Farm. Laura A. B. Hernández.

Fecha de última revisión: Diciembre / 2019. Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica **0800-333-3532** | elea.com

